

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา
และข้อความของคำเตือน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๖ (๘) แห่งพระราชบัญญัตยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยา (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยา ประกาศระบุยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือนไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ในประเทศไทย

“ยา” หมายความว่า ตัวยา ยาปัจจุบัน หรือยาบรรจุเสร็จ ทุกตัวยาเหล่านั้น

“ยาใช้ภายในอก” หมายความว่า ยาที่มีความมุ่งหมายสำหรับใช้กับผิวหนัง หู ตา ชมูก ปาก ทวารหนัก ช่องคลอด หรือห้องส่วนส่วน โดยมีผลในการรักษาเฉพาะที่

“ยาใช้ภายใน” หมายความว่า ยาที่มีความมุ่งหมายสำหรับใช้ภายใน นอกจากที่เป็นยาใช้ภายในอก

๒. ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๕

ฉบับพิเศษ หน้า ๔

เล่ม ๑๐๙ พยนท ๔๔

ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๓๓

(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ห้องแข็งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๘

(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ห้องแข็งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๘

(๔) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ห้องแข็งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๒๘

(๕) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ห้องแข็งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๘

(๖) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ห้องแข็งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๐

(๗) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ห้องแข็งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

ข้อ ๓ ยาดังต่อไปนี้เป็นยาที่ห้องแข็งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา

ฉบับพิเศษ หน้า ๕

เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๔๔

ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๓๓

(๑) ยาต้านชุดเชื้อ ดังต่อไปนี้

(๑.๑) ยาฆ่าพวกละมโนไนโกลโคไซด์ (Aminoglycosides)

สำหรับใช้ภายนอก

“คำเตือน : ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา”

(๑.๒) ยาฆ่าพวกละมโนไนโกลโคไซด์ (Aminoglycosides)

สำหรับใช้กับ疮หรือหู

“คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา

๒. ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติต่อประสาท
หู ทำให้หูหนวกหูดึงได้”

(๑.๓) ยาฆ่าพวกละมโนไนโกลโคไซด์ (Aminoglycosides)

สำหรับใช้ภายใน

“คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา

๒. ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติต่อประสาท
หู ทำให้หูหนวกหูดึงได้”

๓. ยานี้มีพฤติกรรม จึงควรใช้อย่างระมัดระวัง
และลดขนาดยาในผู้บุญที่ให้ทำงานผิด
ปกติ และเด็ก

๔. ไม่ควรใช้ในหารกและหญิงมีครรภ์ หรือ
ระยะใกล้หนอนบุตร”

(๑.๔) ยาฆ่าพวกลบเชิตรานิน (Bacitracin) สำหรับใช้

ภายนอก

“คำเตือน : ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา”

(๑.๔) ยาจ้ำพวกคาวทรีโว/ไนซิน (Capreomycin) และ
วิโโอมีซิน (Viomycin)

- “คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยาด้วย
 ๒. ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติต่อ
 ประสาททุก ทำให้หูหนวกหูดึงได้
 ๓. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อไตได้”

(๑.๕) ยาจ้ำพวกเซฟาโลสปอร์อิน (Cephalosporins)

- “คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยาด้วย
 ๒. ยานี้อาจทำให้เกิดการแพ้ และเป็น^{ด้วย}
 อันตรายถึงตายได้ สำหรับผู้ที่แพ้ยา
 เพนซิลลิน อาจแพ้ยาด้วยด้วย
 ๓. หากเกิดอาการผิดปกติ ระคายเคือง
 หรือบวม ให้หยุดใช้ยา และปรึกษา
 แพทย์”

(๑.๖) ยาจ้ำพวกลอแรมเพนิคอล (Chloramphenicol)

สำหรับใช้ภายนอก

“คำเตือน : ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยาด้วย”

(๑.๗) ยาจ้ำพวกลอแรมเพนิคอล (Chloramphenicol)

สำหรับใช้กับทาหรอทุก

“คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยาด้วย”

ฉบับพิเศษ หน้า ๙

เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๔๔

ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๓๓

๒. ยาน่าอาจทำให้เกิดอันตรายถึงสายตาได้
ให้ใช้ตามแพทย์สั่งโดยเคร่งครัด”

(๑.๕) ยาจ้ำพวกลดแรมเฟนิกอล (Chloramphenicol)

สำหรับใช้ภายใน

- “คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้แพ้ยา
๒. ห้ามใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี ผู้มีไข้
ตัวยิ่งใหญ่ หญิงมีครรภ์ ระยะใกล้
หมดครรภ์
๓. ยาน่าอาจทำให้เกิดอันตรายถึงสายตาได้
ให้ใช้ตามแพทย์สั่งโดยเคร่งครัด”

(๑.๖) ยาคลิโควินอล (Clioquinol) สำหรับใช้

ภายใน

- “คำเตือน : ยาน่าอาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของประสาท
ตา และประสาทขาได้”

(๑.๗) ยาจ้ำพวกล็อกเซอร์น (Cycloserine)

- “คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้แพ้ยา ผู้มีประวัติของ
โรคสมชักหรือโรคทางจิตและประสาท
ที่รุนแรง
๒. ยาน่าอาจทำให้เกิดอันตรายต่อไต จิต
และประสาทได้”

ฉบับพิเศษ หน้า ๔

เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๕๕

ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

๓. ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในหญิงมีครรภ์ ระยะใกล้หนูนารถ
๔. ระหว่างใช้ยา ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

(๑.๐๒) ยาขับพอกฟลูไซโทซิน (Flucytosine)

- “คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้แพ้ยา
๒. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับ ไต ไขกระดูกได้”

(๑.๐๓) ยาขับพอกกรีซิเดค (Fusidic acid) และอนุพันธ์

ของยาดังกล่าว

- “คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้แพ้ยา
๒. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับได้”

(๑.๐๔) ยาขับพอกกรีซิโอลูวิน (Griseofulvin)

- “คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้แพ้ยา
๒. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับ ไต ได้”

(๑.๐๕) ยาขับพอกค์โทโคนาโซล (Ketoconazole)

สำหรับใช้ภายนอก

- “คำเตือน : ห้ามใช้ในผู้แพ้ยา”

(๑.๐๖) ยาขับพอกค์โทโคนาโซล (Ketoconazole)

สำหรับใช้ภายใน

- “คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้แพ้ยา”

๒. ไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ์ ระยะใกล้

นมบตร

๓. ยานอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทับติ๊ด

(๑.๑๗) ยาฆ่าพวกลินโค้มีซิน (Lincomycin) สำหรับ

ใช้ภายนอก

“คำเตือน : ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา”

(๑.๑๘) ยาฆ่าพวกลินโค้มีซิน (Lincomycin) สำหรับ

ใช้ภายใน

“คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา

๒. ควรระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วย โรคตับ โรคไต และโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร โดยเฉพาะโรคลำไส้อักเสบ ท้องเดินเรื่อง”

(๑.๑๙) ยาฆ่าพวkmะโครไรด์ (Macrolides) สำหรับ

ใช้ภายนอก

“คำเตือน : ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา”

(๑.๒๐) ยาฆ่าพวkmะโครไรด์ (Macrolides) สำหรับ

ใช้ภายใน

“คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา

๒. ยานอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทับติ๊ด”

(๑.๒๑) ยาฆ่าเชื้อยีนโคนาโซล (Miconazole)

“คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา

๒. ไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ์ ระยะใกล้

นมบตร

๓. ยานอาจทำให้มีเลือดออกผิดปกติได้”

(๑.๒๒) ยาจำพวกไนโตรฟูแรนโทอิน (Nitrofurantoin)

“คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้แพ้ยา

๒. ห้ามใช้ในผู้มีทั้งอาการน้ำสีเหลือง (Oliguria) หรือน้ำสีขาวไม่ออกราก (Anuria)

๓. ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า ๒ เดือน และในหญิงมีครรภ์”

(๑.๒๓) ยาจำพวกโนโวไบอซิน (Novobiocin)

“คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้แพ้ยา

๒. ยานอาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับได้

๓. ยานอาจทำให้เกิดการผิดปกติของเม็ดเลือดได้”

(๑.๒๔) ยาจำพวกนิสทาทิน (Nystatin) สำหรับใช้

ภายนอก

“คำเตือน : ห้ามใช้ในผู้แพ้ยา”

(๑.๒๕) ยาจำพวกนิสทาทิน (Nystatin) สำหรับใช้

ภายใน

“คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้แพ้ยา”

๒. ยานอาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับ ไต
“ค่าเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา

(๑.๒๖) ยาฆาพวกเพนซิลลิน (Penicillins)

“ค่าเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา
๒. ยานอาจทำให้เกิดการแพ้ อันตรายถึงตายได้
๓. หากเกิดอาการผื่นแดง ระคายเคืองหรือ
บวม ให้หยุดใช้ยา และปรึกษาแพทย์”

(๑.๒๗) ยาฆาพวกโพลิมิกซิน (Polymyxins) สำหรับ

ใช้ภายนอก

“ค่าเตือน : ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา”

(๑.๒๘) ยาฆาพวกโพลิมิกซิน (Polymyxins) สำหรับ

ใช้ภายใน

“ค่าเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา
๒. ยานอาจทำให้เกิดอันตรายต่อไต และ
ระบบประสาทได้”

(๑.๒๙) ยาฆาพวกควีโนโลน (Quinolone) และอนุพันธ์

ของยาดังกล่าว

“ค่าเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา
๒. ยานอาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับ ไต “ได้”

สำหรับยาฆาพวกอะโครโซxaซิน (Acrosoxacin) และกรด
นาลิดิซิก (Nalidixic acid) ต้องเพิ่มค่าเตือนว่า

ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔

เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๔๔

ราชกิจจานุเบนถฯ

๑๕ มีนาคม ๒๕๓๓

“๗. ขณะใช้ยาน ไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล”

(๑.๓๐) ยาจ้ำพวกไรฟามycin (Rifamycins)

“คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้แพ้ยา

๒. ยานอาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับได้”

(๑.๓๑) ยาจ้ำพวกสเปกตินามycin (Spectinomycin)

“คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้แพ้ยา

๒. ยานอาจทำให้เกิดอันตรายต่อไตได้”

(๑.๓๒) ยาจ้ำพวกซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)

สำหรับใช้ภายนอก

“คำเตือน : ห้ามใช้ในผู้แพ้ยา”

(๑.๓๓) ยาจ้ำพวกซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)

สำหรับใช้ภายใน

“คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้แพ้ยา

๒. ยานอาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับ ไต ได้

๓. ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า ๒ เดือน หญิงมีครรภ์ ระยะที่ห้ามบุตร”

(๑.๓๔) ยาจ้ำพวกลูตเตอร์ไซคลิน (Tetracyclines)

สำหรับใช้ภายนอก

“คำเตือน : ห้ามใช้ในผู้แพ้ยา”

(๑.๓๕) ยาจ้ำพวกลูตเตอร์ไซคลิน (Tetracyclines)

สำหรับใช้ภายใน

“คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้แพ้ยา

๒. ห้ามใช้ในเด็ก หญิงมีครรภ์ หรือ หญิง
ระยะใกล้ท่านบุตร”

(๑.๓๖) ยาจ้ำพวกแวนโคไมซิน (Vancomycin)

“คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในผู้แพ้ยา

๒. ในหญิงมีครรภ์ ยานอาจเป็นอันตรายต่อ^๔
ประสานหูของทารกในครรภ์ได้”

(๒) ยาจ้ำพวกแอนติสตาดามีน (Antihistamines) สำหรับใช้
ภายใน

“คำเตือน : ยานอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้น จึงไม่ควร
ขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
กล”

(๒.๑) สำหรับยาจ้ำพวกบิวคลิซีน (Buclizine) ไชคลิซีน
(Cyclizine) คลอร์ไชคลิซีน (Chlorcyclizine) เมคลิซีน (Meclizine) ต้องเพิ่ม
คำเตือนว่า

“และห้ามใช้กับหญิงมีครรภ์ ๓ เดือนแรก หรือคาดว่าจะ^๕
มีครรภ์ เพราะอาจทำให้เด็กในครรภ์พิการได้”

(๒.๒) สำหรับยาจ้ำพวกแอนทาโซลีน (Antazoline)
โปรเมทาซีน (Promethazine) ทีนาลิดีน (Thenalidine) ไทรเมพราซีน
(Trimeprazine) ไทรเพเลนนามีน (Tripeleannamine) ต้องเพิ่มคำเตือนว่า
“และยานอาจทำให้เกิดการผิดปกติของเม็ดเลือดดี”

(๒.๓) สำหรับยาขั้พวกเด็ปโกร์ฟิน (Depropine) ต้องเพิ่มคำเตือนว่า

“และห้ามใช้กับผู้ที่เป็นโรคต้อหิน (Glaucoma) หรือต่อมลูกหมากโต (Prostatic Hypertrophy)”

ยาขั้พวกแอนติชีส�ามีน ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า เทอร์เฟนดีน (Terfenadine) ในขนาด ๖๐ มิลลิกรัม และยาขั้พวกแอนติชีส�ามีน ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า แอสเทมิโซล (Astemizole) ในขนาด ๑๐ มิลลิกรัม ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งข้อความคำเตือนดังกล่าวข้างต้น

(๓) ยาแอสไพริน (Aspirin)

“คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี และหญิงมีครรภ์ระยะใกล้คลอด

๒. ห้ามใช้สำหรับลดไข้ในเด็ก และวัยรุ่นที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ อีสุกอีส และไข้เลือดออก

๓. ห้ามใช้สำหรับคนไข้ซึ่งเป็นโรคแพลงในระบบทางเดินอาหารและโรคหอบหืด”

(๔) ยาขั้พวกไดไฟโรน (Dipyrone)

“คำเตือน : ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายได้ ควรใช้ตามแพทย์สั่ง”

(๕) ยาขั้พวกเฟนิลบิวทาโซน (Phenylbutazone) อินโคเมทาซิน (Indomethacin) สำหรับใช้ภายใน

“คำเตือน : ห้ามใช้กับเด็กวัยด้วยโรคแพ้ไข้ในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ บวมหนื้น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อาการผิดปกติของเม็ดโลหิต ตับ หรือไต”

(๖) ยาจำพวกสงบประสาท (Tranquilizers) สำหรับใช้ภายใน

“คำเตือน : ๑. ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล

๒. การใช้ยานอาจทำให้หัวใจเป็นนิสัยได้ ให้ใช้ตามแพทย์สั่ง”

(๖.๑) สำหรับยาสงบประสาทจำพวกไฮดรอกไซดิน (Hydroxyzine) ต้องเพิ่มคำเตือนว่า

“๓. ห้ามใช้กับหญิงมีครรภ์ ๓ เดือนแรกหรือคาดว่าจะมีครรภ์ เพราะอาจทำให้เด็กในครรภ์พิการได้”

(๖.๒) สำหรับยาสงบประสาทจำพวกเบนโซดีอาเซพีน (Benzodiazepines) ต้องเพิ่มคำเตือนว่า

“๓. ยานี้อาจทำให้เกิดการผิดปกติของเม็ดเลือด ตับ และไต ได้

๔. ห้ามใช้กับหญิงมีครรภ์ ๓ เดือนแรก หรือคาดว่าจะมีครรภ์ เพราะอาจทำให้เด็กในครรภ์พิการได้”

(๖.๓) สำหรับยาสูบประสาทจำพวกบิวไท์โรฟโนน (Butyrophenones) ไทบามेट (Tybamate) ต้องเพิ่มคำเตือนว่า

“๗. ยานี้อาจทำให้เกิดการผิดปกติของเม็ดเลือด ความดันโลหิตต่ำ ตัวเหลือง ความร้อนของร่างกาย สูง”

(๖.๔) สำหรับยาสูบประสาทจำพวกฟูโนไทอาซีน (Phenothiazines) อัซพาฟโนไทอาซีน (Azaphenothiazines) พิโมไซด์ (Pimozide) ไพรไทเพนดิล (Prothipendyl) ต้องเพิ่มคำเตือนว่า

“๗. ยานี้อาจทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ การผิดปกติของเม็ดเลือด ตับ ไต หัวใจ และหลอดเลือด”

(๗) ยาจำพวกระงับประสาท (Sedatives & Hypnotics)

“คำเตือน : ๑. ยานี้ทำให้เกิดอาการง่วงซึม ซึ่งไม่ควรเข้าสู่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล

๒. การใช้ยานี้อาจทำให้ติดเป็นนิสัยได้ ให้ใช้ตามแพทย์สั่ง

๓. ไม่ควรดื่มสุรา เครื่องดื่ม หรือยาที่มีผลกันยอยด์”

(๗.๑) สำหรับยาสูบประสาทจำพวกบาร์บิทูเรต (Barbiturates) ต้องเพิ่มคำเตือนว่า

“๔. ยา*น้ำ*อาจทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ เส้นเลือดส่วนปลายฟูบແປบภาวะการหายใจถูกกด หรือการผิดปกติของหัวใจและไต”

(๗.๖) สำหรับยาแรงบประสาทจำพวกที่ไม่ใช่บาร์บิทูเรต (Nonbarbiturates) ต้องเพิ่มคำเตือนว่า

“๕. ยา*น้ำ*อาจทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ ความร้อนในร่างกายลดต่ำ หายใจไม่สะดวก สมองถูกกดอย่างแรง หงุดหงิด การผิดปกติของหัวใจ ตับ และไต”

(๘) ยาลดความอ้วนโดยทำให้เบื่ออาหาร, (Anorexigenics)
“คำเตือน : ยา*น้ำ*อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติทางประสาทได้ ควรใช้ตามแพทย์สั่ง”

(๙) ยาจำพวกกรักยาโรคลมบ้าหมู (Antiepileptics)

“คำเตือน : ๑. ยา*น้ำ*อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม เมื่อรับประทานแล้ว ไม่ควรขับปัสสาวะขณะที่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล และไม่ควรรับประทานร่วมกับสุราหรือสังฆมณฑลก่ออย่างเป็นส่วนประกอบ

๒. ยา*น้ำ*อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของเม็ดเลือด

๓. ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ เพราะอาจทำให้หารกพิการได้
๔. ผู้บุญคุ้ยโรคเกี้ยวกับตับและไตกว่าไข้คุ้ยความระมัดระวัง”

(๑๐) ยาจำพวกอิมิพรามีน (Imipramine)

“คำเตือน : ห้ามใช้กับหญิงมีครรภ์ ๑ เดือนแรก หรือคาดว่าจะมีครรภ์ เพราะอาจทำให้เด็กในครรภ์พิการได้”

(๑๑) ยาไมแอนเซอริน (Mianserin)

“คำเตือน : ยานอาจคิดไว้กระดูกทำให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือดได้”

(๑๒) ยาคุมกำเนิด

“คำเตือน : ๑. หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบปรึกษาแพทย์

๒. ห้ามใช้กับผู้บุญคุ้ยโรคหลอดเลือดอุดตัน โรคตับ”

(๑๓) ยาไดเอทธิสติลเบนสตรอล (Diethyl Stilbestrol)

ไดเอนสตรอล (Dienestrol) เฮกเซสตรอล (Hexestrol) บエンเซสตรอล (Benzestrol)

“คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์

๖. ยานี้อาจทำให้เกิดผิดปกติของเยื่อเมือกด้านในของช่องคลอด (Vaginal Adenosis) ของบุตรฯ”

(๑๔) ยาจำพวกคอร์ติโคสเตอรอยด์ (Corticosteroids)
สำหรับใช้ภายใน

“คำเตือน : ห้ามใช้กับผู้ชายด้วยโรคแพลงในกระเพาะอาหาร หรือลำไส้ โรคเบาหวาน วัณโรค โรคติดเชื้อไวรัส”

(๑๕) ยาจำพวกคอร์ติโคสเตอรอยด์ (Corticosteroids)
สำหรับใช้ภายนอก

“คำเตือน : ห้ามใช้กับโรคติดเชื้อไวรัส”

(๑๖) ยาแก้ไข้โรคเบาหวาน

“คำเตือน : ต้องใช้บันทึกความแพทย์ส่งเท่านั้น หากอาการวิงเวียนจะเมื่นลงให้รับประถมแพทย์”

(๑๗) ยาแก้ไข้โรคมะเร็ง (Antineoplastics)

“คำเตือน : ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใน ให้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น”

(๑๘) ยาจำพวกสารอนุ

“คำเตือน : หากใช้บ่อย ๆ หรือใช้เป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ตามแพทย์สั่ง”

ฉบับพิเศษ หน้า ๒๐

เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๔๔

ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๓๓

(๑๕) ยาจำพวกไตรพิน (Atropine) ไฮโซสซิน (Hyoscine)
ไฮโซสไซามีน (Hyoscyamine) สตราโนเมเนียม (Stramonium)

“คำเตือน : ๑. ผู้สูงอายุหรือเด็กอายุต่ำกว่า ๖ ปี ควรใช้
ความแพหดยสั้น

๒. ห้ามใช้ในโรคค้อหิน (Glaucoma)

๓. หากเกิดอาการช็อกขณะเรื้อรัง นั่งงง หรือ
สายตาพร่า ให้หยุดใช้ยา”

(๑๖) ยาฉีดที่มีเบนซิลแอลกอฮอล์ (Benzyl alcohol) เม็ด
วัดถูกกันเสียบผสมอยู่ด้วย

“คำเตือน : ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี”

(๑๗) กรดบอริก (Boric acid) เกลือของกรดบอริกในรูปของ
ยาผง ยาผงครีม หรือยาทา

“คำเตือน : ห้ามใช้ยานี้มากเกินไป หรือนานเกินไป
 เพราะอาจเป็นอันตรายได้”

(๑๘) ยาทิงเจอร์ฟันการะบุนเกินกว่า ๒ มิลลิกรัมต่อขนาด
รับประทานหนึ่งครั้ง

“คำเตือน : ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า ๖ ปี และคนชรา”

(๑๙) ซินโคเฟน (Cinchophen) และนีโوخินโคเฟน
(Neocinchophen)

“คำเตือน : ๑. อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อตับได้

๒. ห้ามใช้กับผู้มีไข้ด้วยโรคระบบการ
หมุนเวียนของโลหิต โรคตับ โรคไต”

(๒๔) ยาจำพวกไคแอมทาโซล (Diamthazole) สำหรับใช้ภายนอก

“คำเตือน : ๑. ห้ามใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า ๖ ปี
๒. ห้ามใช้กับเนื้อเยื่อ (เยื่อเมือก)”

(๒๕) ยาจำพวกเอฟเฟริน (Ephedrine)

“คำเตือน : ห้ามใช้กับผู้มีวัยด้วยโรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือโรคของท่อลม
ไหระอยด์ นอกจากแพทย์สั่ง”

(๒๖) ยา헥ซิลเรซอร์ซินอล (Hexylresorcinol) เทหาราคลอ
ເອທິລີນ (Tetrachloreythylene)

“คำเตือน : ห้ามเคี้ยวชา หรือทำให้มึดยาแพกในปาก”

(๒๗) ยาจำพวกไอโอดีน (Iodine) ไอโอดีด (Iodide)
สำหรับใช้ภายนอก

“คำเตือน : หากเกิดอาการผื่นแดง ปวดท้อง อาเจียน
หายใจไม่สะดวกให้หยุดใช้ยา และปรึกษา
แพทย์”

(๒๘) ยาถ่าย ยาระบาย

“คำเตือน : ห้ามใช้เมื่อมีอาการปวดท้องหรือคลื่นไส้
อาเจียน”

(๒๙) ยาโลเพอรามายด์ (Loperamide)

“คำเตือน : ๑. ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า ๖ ปี และ
คนชรา

๒. หลังจากใช้รักษาโรคท้องร่วงชนิดเฉียบ
พลันเกิน ๔๘ ชั่วโมงไปแล้ว และอาการ
ไม่ดีขึ้นให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์”

(๓๐) ยาจำพวกกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม (Hair Growth Stimulant) ซึ่งประกอบด้วยยาสำคัญ ไมเน็อกซิดิล (Minoxidil) สำหรับใช้ภายนอก

“คำเตือน : ๑. ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้

๒. ยานี้อาจมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด

๓. ผู้ที่เคยแพ้ยาจะร่วงหลังจากหยุดยา ๒-๓ เดือน”

(๓๑) ยาจำพวกสารหนุ (Arsenic) ที่ใช้สำหรับสัตว์

“คำเตือน : ๑. ห้ามใช้กับแม่ไก่ระยะออกไข่

๒. หยุดใช้ยาถ้ามีผื่นสิวบวม”

(๓๒) ยาฟูราลทาโดน (Furaltadone) ที่ใช้สำหรับสัตว์

“คำเตือน : ห้ามใช้ยานี้กับเบ็ค”

(๓๓) ยาจำพวกฮอร์โมน (Hormones) ชนิดเม็ดสำหรับตอนไก่

“คำเตือน : เมื่อใช้ยานี้สำหรับตอนไก่ ห้ามมาร่าไก่
รับประทานก่อนระยะเวลาสักสิบห้าวัน และ^๑
ให้ตัดส่วนที่ผุงยาง”

ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑

เล่ม ๐๐๑ ตอนที่ ๔๔

ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๓๓

(๗๔) ข้าเทกราคลอเอทิลีน (Tetrachlorethylene) ที่ใช้
สำหรับสัตว์

“คำเตือน : การใช้ขายน้ำทึบระหว่างอย่างให้เม็ดยาแตกใน
ปาก”

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจ
จานเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓

มารูด บุนนาค
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข