

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน
ฉบับที่ ๗๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๖ (๙) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ ๔๐๑-๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗๔) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓

“(๗๔) ยาคลอโรควิน (chloroquine) และยาไฮดรอกซีคลอโรควิน (hydroxychloroquine) สำหรับมนุษย์

คำเตือนในฉลาก

๑. หากใช้yanineแล้วมีอาการเข้า ผื่นแดง ตาแดง ตุ่มน้ำพอง ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรทันที

๒. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยา

๓. หากใช้yanineในระยะยาว ควรตรวจตาเมื่อเริ่มใช้ยา และตรวจติดตามเป็นระยะ ในขณะที่ใช้ยา

คำเตือนในเอกสารกำกับยา

๑. หากใช้yanineแล้วมีอาการเข้า ผื่นแดง ตาแดง ตุ่มน้ำพอง ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรทันที

๒. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยา

๓. หากใช้yanineในระยะยาว ควรตรวจตาเมื่อเริ่มใช้ยา และตรวจติดตามเป็นระยะ ในขณะที่ใช้ยา

๔. เมื่อใช้yanineหากมีอาการ เช่น ไข้ เยื่อบุต้าอักเสบ ผื่น แดง ตุ่มน้ำพอง มีการหลุดลอกของผิวนังและบริเวณเยื่อบุต่าง ๆ เช่น ช่องปาก ลำคอ จมูก อวัยวะสีบพันธุ์ ให้หยุดยา และรีบปรึกษาแพทย์ทันที เพราะอาจเกิดกลุ่มอาการสตีเวนส์จอห์นสัน”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑.๑๙) และ (๑.๒๐) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในคลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑.๑๙) ยาจำพวกมัครोไอลิด (Macrolides) สำหรับใช้ภายนอก ที่เป็นทะเบียนตำรับยา สำหรับมนุษย์

คำเตือน : ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา

(๑.๒๐) ยาจำพวกมัครอไอลิด (Macrolides) สำหรับใช้ภายนอกที่เป็นทะเบียนตำรับยา สำหรับมนุษย์ ยกเว้น อะซิโทรามีซิน (azithromycin) และคลาริโทรามีซิน (clarithromycin)

คำเตือนในคลาก

๑. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา
๒. ผู้ที่เป็นโรคตับระดับรุนแรงการใช้ยา
๓. ห้ามใช้ยาที่ร่วมกับยา抗มาเรนที่มีเออร์กอตตามีนเป็นส่วนประกอบ
๔. สตรีมีครรภ์ระมัดระวังการใช้ยา
๕. หากใช้ยาที่แล้วมีไข้สูง ปวดเมื่อย ผื่นแดง ตุ่มน้ำ庖 ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรทันที
๖. หากใช้ยาที่แล้วหัวใจเต้นผิดปกติ ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันที
๗. ผู้ที่ได้รับยา抗มาเรนท์ (digoxin) หรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด (warfarin) หรือยาต้านไวรัสเซอชไอวีบังชนิด ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา

คำเตือนในเอกสารกำกับยา

๑. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา
๒. ผู้ที่เป็นโรคตับระดับรุนแรงการใช้ยา
๓. ห้ามใช้ยาที่ร่วมกับยา抗มาเรนที่มีเออร์กอตตามีนเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้พิการ หรือเสียชีวิตได้
๔. สตรีมีครรภ์ระมัดระวังการใช้ยา
๕. หากใช้ยาที่แล้วมีผื่นแดง ตุ่มน้ำ庖 ต่อมน้ำเหลืองโต หรือมีไข้สูงที่ไม่ใช่อาการ ที่มีอยู่เดิม ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทันที เพราะอาจเป็นผื่นแพ้ยาที่รุนแรงได้ (Severe cutaneous adverse drug reactions; SCARs)

๖. ยาที่อาจทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ QT ยาวขึ้นได้ จึงควรระมัดระวังการใช้ยาที่ในผู้ป่วย ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะดังกล่าว เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการ หัวใจเต้นผิดปกติ ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยที่มีระดับเบต้าเซเรียลในเลือดต่ำกว่าปกติ เป็นต้น

๗. ระมัดระวังการใช้ยาที่ร่วมกับยาที่เปลี่ยนแปลงผ่าน CYP3A4 เช่น warfarin ยา抗มาเรนท์ โรคหัวใจ เช่น digoxin, HIV protease inhibitors เช่น ritonavir เมื่อจากระดับยาเหล่านี้

ในเลือดอาจสูงขึ้นจนเกิดอันตรายได้ และยาลดระดับไขมันในเลือด เช่น simvastatin, atorvastatin เนื่องจากพคความเสี่ยงของการเกิดภาวะกล้ามเนื้อผิดปกติ (myopathy) หรือภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย (rhabdomyolysis) มากขึ้น

(๑.๒๐.๑) ยาอะซิโทรไมซิน (azithromycin)

คำเตือนในฉลาก

๑. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา呢
๒. ผู้ที่เป็นโรคตับระมัดระวังการใช้ยา呢
๓. ระมัดระวังการใช้ยา呢ร่วมกับยา抗凝血药ที่มีเออร์กอตตามีนเป็นส่วนประกอบ
๔. สตรีมีครรภ์ระมัดระวังการใช้ยา呢
๕. หากใช้ยา呢แล้วมีไข้สูง ปวดเมื่อย ผื่นแดง ตุ่มน้ำ庖 ให้หยุดยาและรับประคบรักษาแพทย์

หรือเภสัชกรทันที

๖. หากใช้ยา呢แล้วหัวใจเต้นผิดปกติ ให้หยุดยาและรับประคบรักษาแพทย์

๗. ผู้ที่ได้รับยา抗凝血药หัวใจ (digoxin) หรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด (warfarin) หรือยาต้านไวรัสเชื้อไวรัสชนิด ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา呢

คำเตือนในเอกสารกำกับยา

๑. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา呢
๒. ผู้ที่เป็นโรคตับระมัดระวังการใช้ยา呢
๓. ระมัดระวังการใช้ยา呢ร่วมกับยา抗凝血药ที่มีเออร์กอตตามีนเป็นส่วนประกอบ

เพราะอาจทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้

๔. สตรีมีครรภ์ระมัดระวังการใช้ยา呢

๕. หากใช้ยา呢แล้วมีผื่นแดง ตุ่มน้ำ庖 ต่อมน้ำเหลืองโต หรือมีไข้สูง ที่ไม่ใช่อาการที่มีอยู่เดิม ให้หยุดยาและรับประคบรักษาแพทย์หรือเภสัชกรทันที เพราะอาจเป็นผื่นแพ้ยา ที่รุนแรงได้ (Severe cutaneous adverse drug reactions; SCARs)

๖. ยา呢อาจทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ QT ยาวขึ้นได้ จึงควรระมัดระวังการใช้ยา呢 ในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะดังกล่าว เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยที่มีระดับไปต่ำสุดในเลือดต่ำกว่าปกติ เป็นต้น

๗. ระมัดระวังการใช้ยา呢ร่วมกับยาที่เปลี่ยนแปลงผ่าน CYP3A4 เช่น warfarin ยา抗凝血药หัวใจ เช่น digoxin, HIV protease inhibitors เช่น ritonavir เนื่องจากจะดับยาเหล่านี้ ในเลือดอาจสูงขึ้นจนเกิดอันตรายได้ และยาลดระดับไขมันในเลือด เช่น simvastatin, atorvastatin เนื่องจากพคความเสี่ยงของการเกิดภาวะกล้ามเนื้อผิดปกติ (myopathy) หรือภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย (rhabdomyolysis) มากขึ้น

(๑.๒๐.๒) ยาคลาริโธร์莫ซิน (clarithromycin)

คำเตือนในฉลาก

๑. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา呢
๒. ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
๓. ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยา抗มาเรนที่มีเօร์กอตตามีนเป็นส่วนประกอบ
๔. สตรีมีครรภ์หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้
๕. หากใช้ยานี้แล้วมีไข้สูง ปวดเมื่อย ผื่นแดง ตุ่มน้ำ庖 ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์

หรือเภสัชกรทันที

๖. หากใช้ยานี้แล้วหัวใจเต้นผิดปกติ ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

๗. ผู้ที่ได้รับยา抗มาเรนหัวใจ (digoxin) หรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด (warfarin)

หรือยาต้านไวรัสเอชไอวีบางชนิด ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้

คำเตือนในเอกสารกำกับยา

๑. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา呢
๒. ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคตับ

๓. ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยา抗มาเรนที่มีเօร์กอตตามีนเป็นส่วนประกอบ

เพราะอาจทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้

๔. สตรีมีครรภ์หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้

๕. หากใช้ยานี้แล้วมีผื่นแดง ตุ่มน้ำ庖 ต่อมน้ำเหลืองโต หรือมีไข้สูง

ที่ไม่ใช่อาการที่มีอยู่เดิม ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทันที เพราะอาจเป็นผื่นแพ้ยาที่รุนแรงได้ (Severe cutaneous adverse drug reactions; SCARs)

๖. ยานี้อาจทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ QT ยาวขึ้นได้ จึงควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะดังกล่าว เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยที่มีระดับไปต์สเซียมในเลือดต่ำกว่าปกติ เป็นต้น

๗. ระมัดระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่เปลี่ยนแปลงผ่าน CYP3A4 เช่น warfarin ยา抗มาเรนหัวใจ เช่น digoxin, HIV protease inhibitors เช่น ritonavir เนื่องจากจะตัดยาเหล่านี้ในเลือดอาจสูงขึ้นจนเกิดอันตรายได้ และยาลดระดับไขมันในเลือด เช่น simvastatin, atorvastatin เนื่องจากพบร่วมกับยาที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะกล้ามเนื้อผิดปกติ (myopathy) หรือภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย (rhabdomyolysis) มากขึ้น”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชลน่าน ศรีแก้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข