

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๖ (๕) (๗) (๘) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการยา ในการประชุมครั้งที่ ๔๑๙-๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้าน ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(๔) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(๕) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(๖) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(๗) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๘) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๙) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓ ให้ยาแผนปัจจุบันที่มีตำรับยา สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คำเตือน การเก็บรักษา และขนาดบรรจุ ตามภาคผนวก ๑ ท้ายประกาศนี้ เป็นยาสามัญประจำบ้าน

ข้อ ๔ ให้ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบันใช้เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน ตามภาคผนวก ๒ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๕ การแสดงคำเตือนบนเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนให้เป็นไปตามภาคผนวก ๒ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๖ กรณีใช้เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-labeling) ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันจัดให้ฉลาก แสดงข้อความ ภาพ เครื่องหมายในรูปแบบดิจิทัลที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเอกสารกำกับยา อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเชื่อมต่อข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฉลากต้องแสดงข้อมูล ตามภาคผนวก ๑ ทั้งนี้ อาจแสดงเอกสารกำกับยาดังกล่าวไว้ร่วมกับฉลากก็ได้

กรณีที่ใช้เอกสารกำกับยาร่วมกับฉลาก ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบันจัดให้มีข้อมูลบนฉลากยาเป็นไปตามมาตรา ๒๕ (๓) (๕) และมาตรา ๒๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๗ (๓) (๕) และมาตรา ๒๗ วรรคสอง แล้วแต่กรณี โดยฉลากยาดังกล่าวสามารถ ยกเว้นการแสดงสูตรตำรับ และขนาดบรรจุ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวนี้ให้แสดง ในเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-labeling) แทนได้

ข้อ ๗ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันที่ได้ขึ้นทะเบียน ตำรับยาไว้และประสงค์จะทำการผลิต นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาสามัญ ประจำบ้าน ยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยา โดยมีสูตรตำรับยา สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คำเตือน การเก็บรักษา และขนาดบรรจุ ให้เป็นไปตามภาคผนวก ๑ ท้ายประกาศนี้ เมื่อได้รับอนุญาต ให้แก้ไขทะเบียนตำรับยาแล้ว จึงจะผลิตหรือนำหรือสั่งยาดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรได้

ข้อ ๘ ยาสามัญประจำบ้านที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านต่อไปจนกว่ายาจะสิ้นอายุ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สมศักดิ์ เทพสุทิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก ๑
แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๘

กลุ่มที่ ๑ :	ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ	(๑๓ รายการ)
กลุ่มที่ ๒ :	ยาแก้ท้องเสีย	(๒ รายการ)
กลุ่มที่ ๓ :	ยาระบาย	(๕ รายการ)
กลุ่มที่ ๔ :	ยาถ่ายพยาธิลำไส้	(๑ รายการ)
กลุ่มที่ ๕ :	ยาบรรเทาปวด ลดไข้	(๔ รายการ)
กลุ่มที่ ๖ :	ยาแก้แพ้ลดน้ำมูก	(๑ รายการ)
กลุ่มที่ ๗ :	ยาแก้ไอ ขับเสมหะ	(๒ รายการ)
กลุ่มที่ ๘ :	ยาดมหรือทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก	(๓ รายการ)
กลุ่มที่ ๙ :	ยาแก้เมารถ เมาเรือ	(๑ รายการ)
กลุ่มที่ ๑๐ :	ยาสำหรับโรคตา	(๑ รายการ)
กลุ่มที่ ๑๑ :	ยาสำหรับโรคปาก และลำคอ	(๕ รายการ)
กลุ่มที่ ๑๒ :	ยาใส่แผล ล้างแผล	(๗ รายการ)
กลุ่มที่ ๑๓ :	ยารักษาแผลติดเชื้อ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก	(ไม่มีรายการ)
กลุ่มที่ ๑๔ :	ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ แมลงกัดต่อย	(๑ รายการ)
กลุ่มที่ ๑๕ :	ยาสำหรับโรคผิวหนัง	(๖ รายการ)
กลุ่มที่ ๑๖ :	ยาบำรุงร่างกาย	(๖ รายการ)

กลุ่มที่ ๑ ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ (๑๓ รายการ)

(๑.๑) ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา - แมกนีเซียม

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Aluminium Hydroxide 200 - 600 mg. Magnesium Hydroxide 200 - 400 mg.
สรรพคุณ	บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ และปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้
ขนาดและวิธีใช้	เคี้ยวยาก่อนกลืน รับประทานหลังอาหาร ๒๐ นาทีถึง ๑ ชั่วโมง และก่อนนอนหรือเมื่อมีอาการ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ - ๔ เม็ด เด็ก ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ เม็ด
คำเตือนบนฉลาก	๑. ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต ๒. ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง สำหรับตำรับ ที่มี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ในขนาด รับประทานต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115 mg.) ให้แจ้งคำเตือนดังนี้ ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคไต ๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๐ เม็ด

(๑.๒) ยาน้ำลดกรด อะลูมินา - แมกนีเซียม

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๕ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Aluminium Hydroxide 165 - 650 mg. Magnesium Hydroxide 103 - 500 mg.
สรรพคุณ	บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ และปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร หรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้
ขนาดและวิธีใช้	เขย่าขวดก่อนใช้ยา รับประทานหลังอาหาร ๒๐ นาทีถึง ๑ ชั่วโมง และก่อนนอนหรือเมื่อมีอาการ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ - ๔ ช้อนชา เด็ก ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ ช้อนชา เด็ก ๓ - ๖ ปี รับประทานครั้งละ ครึ่ง - ๑ ช้อนชา
คำเตือนบนฉลาก	๑. ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต ๒. ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง สำหรับตำรับ ที่มี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ในขนาด รับประทานต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115 mg.) ให้แจ้งคำเตือนดังนี้ ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคไต ๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๔๕๐ มิลลิลิตร

(๑.๓) ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดาไมนัท

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Sodium Bicarbonate 300 mg. Peppermint Oil 0.003 ml.
สรรพคุณ	บรรเทาอาการจุกเสียด ลดอาการระคายเคือง เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานหลังอาหาร ๑ ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๓ - ๖ เม็ด เด็ก ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ - ๓ เม็ด
คำเตือนบนฉลาก	๑. ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต ๒. ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๐ เม็ด

(๑.๔) ยาขับลม

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๑๕ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Capsicum Tincture 0.060 - 0.500 ml. Compound Cardamom Tincture 0.035 - 1.800 ml. Strong Ginger Tincture 0.024 - 0.240 ml.
สรรพคุณ	บรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ และขับลมในกระเพาะอาหาร
ขนาดและวิธีใช้	เขย่าขวดก่อนใช้ยา รับประทานวันละ ๓ - ๔ ครั้ง ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ หรือ ๒ ช้อนโต๊ะ เด็ก ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ หรือ ๑ ช้อนโต๊ะ (โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)
คำเตือนบนฉลาก	ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ...% ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๔๕๐ มิลลิลิตร

(๑.๕) ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาราดุน้ำแดง

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๑๕ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Sodium Bicarbonate 0.15 - 0.60 g. Compound Rhubarb Tincture 0.50 - 2.00 ml. และ/หรือ Tincture อื่น ๆ ที่มีสรรพคุณทางยา ได้แก่ Compound Cardamom Tincture 0.01 - 1.00 ml. Compound Gentian Tincture 0.18 - 1.10 ml. Compound Tinospora Tincture 0.50 ml. Weak Ginger Tincture 0.48 - 2.01 ml. Strong Ginger Tincture 0.10 - 0.30 ml. Ipecacuanha Tincture 0.18 - 0.30 ml. และ/หรือ volatile substance อื่น ๆ ที่มีสรรพคุณทางยา ได้แก่ Peppermint Spirit 0.15 - 0.30 ml. Peppermint Oil 0.03 - 0.20 ml.
---------	---

	Menthol	0.05 - 0.30 ml.
	Concentrated Dill Water	0.10 ml.
	Camphor	19.00 mg.
สรรพคุณ	บรรเทาอาการปวดท้องเนื่องจากจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ	
ขนาดและวิธีใช้	เขย่าขวดก่อนใช้ยา รับประทานก่อนอาหารวันละ ๓ ครั้ง ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ หรือ ๒ ช้อนโต๊ะ เด็ก ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ครึ่ง หรือ ๑ ช้อนโต๊ะ	
คำเตือนบนฉลาก	๑. ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต ๒. ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง ๓. ไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่ต้องจำกัดปริมาณโซเดียม สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร ๔. ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ...% ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง	
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา	
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๔๕๐ มิลลิลิตร	

หมายเหตุ สูตรตำรับขนาดและวิธีใช้ ตามความเห็นชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับขึ้นทะเบียนตำรับยา
แผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์

(๑.๖) ยาน้ำแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนต

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๕ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Sodium Bicarbonate 50 mg. โดยในสูตรตำรับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็นส่วนผสม
สรรพคุณ	บรรเทาอาการท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร
ขนาดและวิธีใช้	ใช้ป้อนให้ทารกและเด็กหลังอาหาร หรือเมื่อมีอาการ ไม่ควรให้เกินวันละ ๖ ครั้ง เด็กอายุ ๒ - ๓ ปี ครั้งละ ๒ - ๓ ช้อนชา เด็กอายุ ๖ - ๑๒ เดือน ครั้งละ ๒ ช้อนชา เด็กอายุ ๑ - ๖ เดือน ครั้งละ ๑ ช้อนชา ทารกแรกเกิด - ๑ เดือน ไม่ควรใช้
คำเตือนบนฉลาก	1. ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต 2. ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๖๐ มิลลิลิตร

(๑.๗) ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์มหาหิงค์

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Asafetida 20% w/v
สรรพคุณ	บรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวดท้องในเด็ก
ขนาดและวิธีใช้	ทาบาง ๆ ที่หน้าท้อง วันละ ๒ - ๓ ครั้ง
คำเตือนบนฉลาก	ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๖๐ มิลลิลิตร

(๑.๘) ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา - แมกนีเซียม - ซิเมธิโคน

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Aluminium Hydroxide 200 - 600 mg. Magnesium Hydroxide 200 - 400 mg. Simethicone 40 - 125 mg.
สรรพคุณ	บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร หรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ และช่วยขับลม
ขนาดและวิธีใช้	เคี้ยวยาก่อนกลืน รับประทานหลังอาหาร ๒๐ นาทีถึง ๑ ชั่วโมง และก่อนนอน หรือเมื่อมีอาการ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ - ๔ เม็ด เด็ก ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ เม็ด
คำเตือนบนฉลาก	๑. ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต ๒. ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ ๓. ในกรณีที่รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน ๒ ชั่วโมง สำหรับตำรับที่มี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ในขนาด รับประทานต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115 mg.) ให้แจ้งคำเตือนดังนี้ ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคไต ๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ ๓) ในกรณีที่รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน ๒ ชั่วโมง
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๐ เม็ด

(๑.๙) ยาน้ำลดกรดอะลูมินา - แมกนีเซียม - ซิเมธิโคน

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๕ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Aluminium Hydroxide 165 - 650 mg. Magnesium Hydroxide 103 - 500 mg. Simethicone 20 - 40 mg.
สรรพคุณ	บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร หรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ และช่วยขับลม
ขนาดและวิธีใช้	เขย่าขวดก่อนใช้ยา รับประทานหลังอาหาร ๒๐ นาทีถึง ๑ ชั่วโมง และก่อนนอน หรือเมื่อมีอาการ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ - ๔ ช้อนชา เด็ก ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ ช้อนชา เด็ก ๓ - ๖ ปี รับประทานครั้งละ ครึ่ง - ๑ ช้อนชา
คำเตือนบนฉลาก	๑. ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต ๒. ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ ๓. ในกรณีที่รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน ๒ ชั่วโมง สำหรับตำรับที่มี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ในขนาดรับประทานต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115 mg.) ให้แจ้งคำเตือนดังนี้ ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคไต ๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ ๓) ในกรณีที่รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน ๒ ชั่วโมง

การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๔๕๐ มิลลิลิตร

(๑.๑๐) ยาผงฟูซิตริกแอซิด - โซเดียมไบคาร์บอเนต - โซเดียมคาร์บอเนต

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๑ ซอง ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Citric Acid Anhydrous ไม่เกิน 1.850 g. Sodium Bicarbonate ไม่เกิน 1.960 g. Sodium Carbonate ไม่เกิน 0.430 g.
สรรพคุณ	ลดกรด บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร
ขนาดและวิธีใช้	ผสมน้ำก่อนแก้วรับประทาน หลังหมดฟองฟู ผู้ใหญ่และเด็กอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป ครั้งละ ๑ ซอง รับประทานซ้ำได้อีกภายใน ๒ หรือ ๓ ชั่วโมง ถ้าต้องการ (โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)
คำเตือนบนฉลาก	๑) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคไต ๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๔.๓ กรัม

(๑.๑๑) ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเมธิโคน

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด/แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Simethicone 40 mg. และ 80 mg.
สรรพคุณ	บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด
ขนาดและวิธีใช้	เคี้ยวก่อนกลืน (เฉพาะชนิดเม็ด) ขนาด ๔๐ มิลลิกรัม ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ เม็ด เมื่อมีอาการ วันละ ๔ ครั้ง (ไม่เกินวันละ ๑๒ เม็ด) ขนาด ๘๐ มิลลิกรัม ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด เมื่อมีอาการ วันละ ๔ ครั้ง (ไม่เกินวันละ ๖ เม็ด)
คำเตือนบนฉลาก	๑) หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน ๓ วัน ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ๒) ยานี้ไม่ใช่ยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหาร
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๐ เม็ด/แคปซูล

(๑.๑๒) ยาบรรเทาอาการเสบริ้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อย เนื่องจากกรดไหลย้อน ชนิดเม็ด

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Sodium alginate 250 – 500 mg. หรือในปริมาณอื่นที่เหมาะสม Sodium bicarbonate 95 – 300 mg. หรือในปริมาณอื่นที่เหมาะสม Calcium carbonate 70 – 360 mg. หรือในปริมาณอื่นที่เหมาะสม (ปริมาณอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์)
---------	---

สรรพคุณ	๑. บรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณกลางอกร่วมกับเรอเปรี้ยวและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน หรือ ๒. บรรเทาอาการแสบร้อน บริเวณกลางอก ร่วมกับเรอเปรี้ยวและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน และลดกรดในกระเพาะอาหาร ในกรณีที่มีค่าความสามารถในการสะเทินกรดในกระเพาะอาหาร (Acid Neutralizing Capacity : ANC) ไม่ต่ำกว่า 5 mEq ต่อขนาดการใช้ยาหนึ่งครั้ง
ขนาดและวิธีใช้	ผู้ใหญ่และเด็กอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป กินครั้งละ ๒ - ๔ เม็ด วันละ ๔ ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน
คำเตือนบนฉลาก	๑. ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ โรคไต ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา ๒. หากใช้แล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือแสบท้องให้หยุดยา และไปพบแพทย์ทันที ๓. ในกรณีที่รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน ๒ ชั่วโมง ในกรณีที่มีการใช้แอสปาแตมเป็นสารให้ความหวาน ให้ระบุค่าเตือนเพิ่มเติม ดังนี้ ๔. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีสถานะฟิสิกส์ไตเนเรีย ยานี้มีส่วนประกอบของแอสปาแตม
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๒๐ เม็ด

(๑.๑๓) ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อย เนื่องจากกรดไหลย้อน ชนิดน้ำ

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๑๐ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสาคัญ คือ Sodium alginate 250 - 500 mg. หรือในปริมาณอื่นที่เหมาะสม Sodium bicarbonate 95 - 300 mg. หรือในปริมาณอื่นที่เหมาะสม Calcium carbonate 70 - 360 mg. หรือในปริมาณอื่นที่เหมาะสม (ปริมาณอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์)
สรรพคุณ	๑. บรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณกลางอกร่วมกับเรอเปรี้ยว และอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน หรือ ๒. บรรเทาอาการแสบร้อน บริเวณกลางอก ร่วมกับเรอเปรี้ยวและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน และลดกรดในกระเพาะอาหาร ในกรณีที่มีค่าความสามารถในการสะเทินกรดในกระเพาะอาหาร (Acid Neutralizing Capacity : ANC) ไม่ต่ำกว่า 5 mEq ต่อขนาดการใช้ยาหนึ่งครั้ง
ขนาดและวิธีใช้	ผู้ใหญ่และเด็กอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป รับประทานครั้งละ ๑๐ - ๒๐ มิลลิลิตร (๒ - ๔ ช้อนชา) วันละ ๔ ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน เขย่าขวด/ชองก่อนใช้ยา
คำเตือนบนฉลาก	๑. ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ โรคไต ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา ๒. หากใช้แล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือแสบท้องให้หยุดยา และไปพบแพทย์ทันที ๓. ในกรณีที่รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน ๒ ชั่วโมง ในกรณีที่มีการใช้แอสปาแตมเป็นสารให้ความหวาน ให้ระบุค่าเตือนเพิ่มเติม ดังนี้ ๔. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีสถานะฟิสิกส์ไตเนเรีย ยานี้มีส่วนประกอบของแอสปาแตม
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิลิตร

กลุ่มที่ ๒ ยาแก้ท้องเสีย (๒ รายการ)

(๒.๑) ยาแก้ท้องเสีย ผงน้ำตาลเกลือแร่

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๑ ซอง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Sodium chloride 0.650 g. Trisodium citrate, dihydrate 0.725 g. Potassium chloride 0.375 g. Glucose anhydrous 3.375 g.
สรรพคุณ	ทดแทนการเสียน้ำในรายที่มีอาการท้องร่วง หรือในรายที่อาเจียนมาก ๆ และป้องกันการช็อคเนื่องจากการที่ร่างกายขาดน้ำ
ขนาดและวิธีใช้	เทพงยาทั้งซองละลายในน้ำสะอาด เช่น น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วประมาณ ๒๕๐ มิลลิลิตร (๑ แก้ว) ให้ดื่มมาก ๆ เมื่อเริ่มมีอาการท้องร่วง ถ้าถ่ายบ่อยให้ดื่มบ่อยครั้งขึ้น ถ้าอาเจียนด้วยให้ดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง เด็กอายุมากกว่า ๒ ปี - ผู้ใหญ่ ให้ดื่มสารละลายเกลือแร่ประมาณ ๑ แก้ว (๒๕๐ มิลลิลิตร) ต่อการถ่ายอุจจาระ ๑ ครั้ง หรือตามความกระหายของผู้ป่วย เด็กอ่อน - เด็กอายุ ๒ ปี ให้ดื่มทีละน้อยสลับกับน้ำเปล่าประมาณวันละ ๔ ซอง หรือมากกว่าที่คนไข้ต้องการและดื่มต่อไปจนกว่าอาการจะดีขึ้น
คำเตือนบนฉลาก	๑) ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ ๒) ถ้าผู้ป่วยยังมีอาการอาเจียนมาก เหงื่อออกมาก ตัวเย็น ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไป หรือหมดสติ ควรนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
การเก็บรักษา	๑) ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา ๒) ยาที่ละลายน้ำแล้วเกิน ๒๔ ชั่วโมง ไม่ควรใช้
ขนาดบรรจุ	๑ ซอง สำหรับผสมน้ำ ๒๕๐ มิลลิลิตร

(๒.๒) ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด/แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Activated charcoal 250 - 350 mg.
สรรพคุณ	รักษาอาการท้องเสีย
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานยานี้ก่อนหรือหลังรับประทานยาอื่น ๆ ๒ ชั่วโมง ผู้ใหญ่ และเด็กอายุมากกว่า ๒ ปี รับประทานครั้งละ ๓ - ๔ เม็ด วันละ ๓ - ๔ ครั้ง (โดยให้คณะกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้อง ตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)
คำเตือนบนฉลาก	๑) ห้ามรับประทานยานี้พร้อมกับยาอื่น ๒) รับประทานยาผงถ่านนี้แล้วอุจจาระจะมีสีค่อนข้างดำ ๓) ถ้าอาการท้องเสียยังไม่ดีขึ้นภายใน ๒ - ๓ วัน หลังรับประทานยา ควรปรึกษาแพทย์
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๐ เม็ด/แคปซูล

กลุ่มที่ ๓ ยาระบาย (๕ รายการ)

(๓.๑) ยาระบายกลีเซอรินชนิดเหน็บทวารสำหรับเด็ก

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๑ แห่ง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Glycerin 91% w/w
สรรพคุณ	สำหรับบรรเทาอาการท้องผูก ใช้เหน็บทวารหนักเพื่อช่วยการขับถ่าย
ขนาดและวิธีใช้	ใช้เหน็บทวารหนักครั้งละ ๑ แห่ง เมื่อต้องการ ควรรอไว้ ๑๕ นาที เพื่อให้ตัวยาละลาย
คำเตือนบนฉลาก	ไม่ควรใช้เป็นประจำ
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑.๕ กรัม

(๓.๒) ยาระบายกลีเซอรินชนิดเหน็บทวารสำหรับผู้ใหญ่

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๑ แห่ง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Glycerin 91% w/w
สรรพคุณ	สำหรับบรรเทาอาการท้องผูก ใช้เหน็บทวารหนักเพื่อช่วยการขับถ่าย
ขนาดและวิธีใช้	ใช้เหน็บทวารหนักครั้งละ ๑ แห่ง เมื่อต้องการ ควรรอไว้ ๑๕ นาที เพื่อให้ตัวยาละลาย
คำเตือนบนฉลาก	ไม่ควรใช้เป็นประจำ
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๒.๕๕ กรัม

(๓.๓) ยาระบายแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๑๕ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Magnesium Hydroxide 1.2 g.
สรรพคุณ	ยาระบาย
ขนาดและวิธีใช้	เขย่าขวดก่อนใช้ยา รับประทานก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้า ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๒ - ๓ ช้อนโต๊ะ (๓๐ - ๔๕ มิลลิลิตร) เด็ก ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ ช้อนโต๊ะ (๑๕ - ๓๐ มิลลิลิตร) เด็ก ๑ - ๖ ปี รับประทานครั้งละ ๑ - ๓ ช้อนชา (๕ - ๑๕ มิลลิลิตร)
คำเตือนบนฉลาก	๑) ห้ามใช้เมื่อมีอาการปวดท้อง หรือคลื่นไส้อาเจียน ๒) ไม่ควรรับประทานเป็นประจำ
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๒๐ มิลลิลิตร

(๓.๔) ยาระบายมะขามแขก

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ ฝักมะขามแขกที่เอาเมล็ดออกแล้ว ซึ่งมีปริมาณ Sennosides เทียบเท่ากับ Sennoside B 7.5 mg.
สรรพคุณ	ยาระบาย
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้า ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๓ - ๔ เม็ด เด็ก ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ เม็ด

คำเตือนบนฉลาก	๑) ห้ามใช้เมื่อมีอาการปวดท้องหรือคลื่นไส้อาเจียน ๒) หญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา ๓) ไม่ควรรับประทานเป็นประจำ
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๐ เม็ด

(๓.๕) ยาระบาย โซเดียม คลอไรด์ ชนิดสวนทวาร

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Sodium Chloride 15% w/v
สรรพคุณ	สำหรับบรรเทาอาการท้องผูก ใช้สวนทวารให้ถ่ายอุจจาระ
ขนาดและวิธีใช้	สวนเข้าทางทวารหนัก แล้วกลืนไว้จนทนไว้ไม่ให้ไหลจึงเข้าส้วม ผู้ใหญ่ ใช้ครั้งละ ๒๐ - ๔๐ มิลลิลิตร เด็ก ๖ - ๑๒ ปี ใช้ครั้งละ ๑๐ - ๒๐ มิลลิลิตร เด็ก ๑ - ๖ ปี ใช้ครั้งละ ๕ - ๑๐ มิลลิลิตร
คำเตือนบนฉลาก	ไม่ควรใช้เป็นประจำ
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๒๐ มิลลิลิตร

กลุ่มที่ ๔ ยาถ่ายพยาธิ (๑ รายการ)

(๔.๑) ยาถ่ายพยาธิตัวกลมมีเบนดาโซล

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Mebendazole 100 mg.
สรรพคุณ	ถ่ายพยาธิเส้นด้าย ตัวกลม
ขนาดและวิธีใช้	เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน สำหรับพยาธิเส้นด้ายและพยาธิเข็มหมุด ทั้งเด็กอายุตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด หลังอาหารเย็นเพียง ครั้งเดียว สำหรับพยาธิตัวกลมอื่น ๆ ได้แก่ พยาธิปากขอ พยาธิ ไข่เดือน และพยาธิแส้ม้า ทั้งเด็กอายุตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็นติดต่อกัน ๓ วัน และอาจรับประทานซ้ำอีก ๑ เม็ด หลังจาก การรักษาครั้งแรก ๑ สัปดาห์ต่อมา
คำเตือนบนฉลาก	๑) ไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ์ในระยะ ๓ เดือนแรก และผู้ที่เป็นโรคตับ ๒) ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๖ เม็ด

กลุ่มที่ ๕ ยาบรรเทาปวด ลดไข้ (๔ รายการ)

(๕.๑) ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล ๕๐๐ มิลลิกรัม

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Paracetamol 500 mg.
สรรพคุณ	ลดไข้ บรรเทาอาการปวด
ขนาดและวิธีใช้	น้ำหนักตัวน้อยกว่า ๓๔ กิโลกรัม ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร น้ำหนักตัวมากกว่า ๓๔ ถึง ๕๐ กิโลกรัม กินยาครั้งละ ๑ เม็ด แต่ละครึ่งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้ น้ำหนักตัวมากกว่า ๕๐ ถึง ๖๗ กิโลกรัม กินยาครั้งละ หนึ่งเม็ดครึ่ง วันละไม่เกิน ๕ ครั้ง แต่ละครึ่งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้ น้ำหนักตัวมากกว่า ๖๗ กิโลกรัม กินยาครั้งละ ๒ เม็ด วันละไม่เกิน ๔ ครั้ง แต่ละครึ่งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
คำเตือนบนฉลาก	๑. ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลาก หรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน ๕ วัน ๒. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด ๓. ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต ๔. หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๐ เม็ด

(๕.๒) ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล ๓๒๕ มิลลิกรัม

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Paracetamol 325 mg.
สรรพคุณ	ลดไข้ บรรเทาอาการปวด
ขนาดและวิธีใช้	น้ำหนักตัวตั้งแต่ ๒๒ ถึง ๓๓ กิโลกรัม กินยาครั้งละ ๑ เม็ด แต่ละครึ่งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้ น้ำหนักตัวมากกว่า ๓๓ ถึง ๔๔ กิโลกรัม กินยาครั้งละ หนึ่งเม็ดครึ่ง แต่ละครึ่งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้ น้ำหนักตัวมากกว่า ๔๔ กิโลกรัม กินยาครั้งละ ๒ เม็ด แต่ละครึ่งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
คำเตือนบนฉลาก	๑. ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลาก หรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน ๕ วัน ๒. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด ๓. ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต ๔. หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๐ เม็ด

(๕.๓) ยาน้ำบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล (120mg./5ml.)

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๕ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Paracetamol 120 mg. โดยในสูตรตำรับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็นส่วนผสม																		
สรรพคุณ	ลดไข้ บรรเทาอาการปวด																		
ขนาดและวิธีใช้	อายุน้อยกว่า ๒ เดือน ให้ปรึกษาแพทย์ อายุ ๒ ถึง ๓ เดือนที่มีน้ำหนักตัว ๔ ถึง ๖ กิโลกรัม กินยาครั้งละ ครึ่งช้อนชา (หรือ ๒.๕ มิลลิลิตร) วันละ ๑ ครั้ง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้ หากจำเป็น กินได้อีกครั้ง ห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง ถ้าไม่ดีขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร อายุมากกว่า ๓ เดือน กินยาเฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้ วันละไม่เกิน ๕ ครั้ง แต่ละครึ่งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง ตามขนาดยาในตาราง <table border="1"><thead><tr><th>น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)</th><th>ช้อนตวงยา</th><th>กระบอกฉีดยา*</th></tr></thead><tbody><tr><td>ตั้งแต่ ๔ ถึง ๖</td><td>ครึ่งช้อน</td><td>๒.๕ มิลลิลิตร</td></tr><tr><td>มากกว่า ๖ ถึง ๘</td><td>สามส่วนสี่ช้อน</td><td>๓.๗๕ มิลลิลิตร</td></tr><tr><td>มากกว่า ๘ ถึง ๑๒</td><td>หนึ่งช้อน</td><td>๕ มิลลิลิตร</td></tr><tr><td>มากกว่า ๑๒ ถึง ๑๖</td><td>หนึ่งช้อนครึ่ง</td><td>๗.๕ มิลลิลิตร</td></tr><tr><td>มากกว่า ๑๖ ถึง ๒๔</td><td>สองช้อน</td><td>๑๐ มิลลิลิตร</td></tr></tbody></table> *หรือถ้วยตวงยา	น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ช้อนตวงยา	กระบอกฉีดยา*	ตั้งแต่ ๔ ถึง ๖	ครึ่งช้อน	๒.๕ มิลลิลิตร	มากกว่า ๖ ถึง ๘	สามส่วนสี่ช้อน	๓.๗๕ มิลลิลิตร	มากกว่า ๘ ถึง ๑๒	หนึ่งช้อน	๕ มิลลิลิตร	มากกว่า ๑๒ ถึง ๑๖	หนึ่งช้อนครึ่ง	๗.๕ มิลลิลิตร	มากกว่า ๑๖ ถึง ๒๔	สองช้อน	๑๐ มิลลิลิตร
น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ช้อนตวงยา	กระบอกฉีดยา*																	
ตั้งแต่ ๔ ถึง ๖	ครึ่งช้อน	๒.๕ มิลลิลิตร																	
มากกว่า ๖ ถึง ๘	สามส่วนสี่ช้อน	๓.๗๕ มิลลิลิตร																	
มากกว่า ๘ ถึง ๑๒	หนึ่งช้อน	๕ มิลลิลิตร																	
มากกว่า ๑๒ ถึง ๑๖	หนึ่งช้อนครึ่ง	๗.๕ มิลลิลิตร																	
มากกว่า ๑๖ ถึง ๒๔	สองช้อน	๑๐ มิลลิลิตร																	
คำเตือนบนฉลาก	๑. ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลาก หรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรรีดยานี้ติดต่อกันเกิน ๕ วัน ๒. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด ๓. ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต ๔. หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที																		
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา																		
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๖๐ มิลลิลิตร																		

(๕.๔) พลาสเตอร์บรรเทาปวด

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่ Borneol 0.21 - 1.00% w/w Camphor 1.00 - 2.80% w/w Caoutchouc 30.00% w/w Ethylene Glycol Salicylate 2.00 - 6.00% w/w Eucalyptus Oil 0.50% w/w Menthol 0.30 - 6.49% w/w Methyl Salicylate 0.14 - 6.00% w/w Peppermint Oil 0.50 - 2.00% w/w Thymol 0.14 - 0.50% w/w Capsaicin Extract 0.65% w/w
---------	--

	Polybutene	12.00% w/w
	Capsicum Powder	11.00% w/w
	Capsicum Oleoresin	3.00 - 11.00% w/w
	และ/หรือ Zinc Oxide	14.00 - 22.00% w/w
สรรพคุณ	ใช้บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ	
ขนาดและวิธีใช้	เช็ดบริเวณผิวหนังที่จะปิดให้สะอาดและแห้ง ปิดพลาสติกอร์ ตรงบริเวณที่มีอาการปวด ควรเปลี่ยนวันละ ๑ - ๒ ครั้ง	
คำเตือนบนฉลาก	อย่าใช้พลาสติกอร์นี้ในบริเวณเยื่อหุ้มตา หรือบริเวณบาดแผลเปิด	
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา	
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๐ แผ่น	

กลุ่มที่ ๖ ยาแก้แพ้ลดน้ำมูก (๑ รายการ)

(๖.๑) ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน้ำมูก คลอร์เฟนิรามีน

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Chlorpheniramine Maleate 2 mg.
สรรพคุณ	บรรเทาอาการแพ้ เช่น ลมพิษ น้ำมูกไหล
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานทุก ๔ - ๖ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ เม็ด ไม่ควรรับประทานเกินวันละ ๑๒ เม็ด เด็ก ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด ไม่ควรรับประทานเกินวันละ ๖ เม็ด
คำเตือนบนฉลาก	๑) ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันนานเกิน ๗ วัน ๒) ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับขียานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๐ เม็ด

กลุ่มที่ ๗ ยาแก้ไอ ขับเสมหะ (๒ รายการ)

(๗.๑) ยาน้ำแก้ไอขับเสมหะสำหรับเด็ก

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๕ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Ammonium Carbonate 0.02 g. Glycyrrhiza Fluidextract 0.25 ml.
สรรพคุณ	บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานวันละ ๓ - ๔ ครั้ง เด็ก ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๒ ช้อนชา (๑๐ มิลลิลิตร) เด็ก ๓ - ๖ ปี รับประทานครั้งละ ๑ ช้อนชา (๕ มิลลิลิตร) เด็ก ๑ - ๓ ปี รับประทานครั้งละ ครึ่ง ช้อนชา (๒.๕ มิลลิลิตร)
คำเตือนบนฉลาก	-
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๒๐ มิลลิลิตร

(๗.๒) ยาแก้ไอน้ำดำ

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๕ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Glycyrrhiza Fluidextract 0.6 ml. Antimony Potassium Tartrate 1.2 - 2.0 mg. Camphorated Opium Tincture 0.6 ml.
สรรพคุณ	บรรเทาอาการไอ และช่วยขับเสมหะ
ขนาดและวิธีใช้	เขย่าขวดก่อนใช้ รับประทานวันละ ๓ - ๔ ครั้ง ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ ช้อนชา (๕ - ๑๐ มิลลิลิตร) เด็ก ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ครั้ง - ๑ ช้อนชา (๒.๕ - ๕ มิลลิลิตร)
คำเตือนบนฉลาก	๑) ห้ามใช้ยานี้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า ๖ ปี คนชรา และหญิงมีครรภ์ ๒) ห้ามใช้ยานี้ติดต่อกันนานเกิน ๓ วัน ๓) ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ...% ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๖๐ มิลลิลิตร

กลุ่มที่ ๘ ยาต้มหรือแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก (๓ รายการ)

(๘.๑) ยาต้มแก้วิงเวียน เหล้าแอมโมเนียหอม

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Ammonium Carbonate 3.40% w/v Strong Ammonia Solution 3.60 - 6.75% v/v
สรรพคุณ	ดม บรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืด หรือท้าวหน้าบรรเทาอาการเนื่องจากพิษแมลงกัดต่อย หรือถูกพิษมีพิษ
ขนาดและวิธีใช้	ใช้สูบสำลิตม หรือใช้ทา
คำเตือนบนฉลาก	ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๕ มิลลิลิตร

(๘.๒) ยาต้มแก้วิงเวียน แก้คัดจมูก

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่ Menthol 0.07 - 77.90% w/v Camphor 0.45 - 42.00% w/v Methyl Salicylate 3.00 - 15.00% w/v Anise Oil 0.68% v/v Burgamot Oil 0.50 - 0.68% v/v Cajuput Oil 0.50 - 11.00% v/v Cassia Oil 0.50% w/v Clove Oil 1.25% v/v Dwarf - Pine Needle Oil 1.00% w/v Eucalyptus Oil 1.50 - 23.00% v/v
---------	--

	Lavender Oil	4.69 - 8.00% v/v
	Peppermint Oil	2.20 - 10.38% v/v
	Sage Oil	6.00% w/v
	Sassafras Oil	5.00% w/v
	Turpentine Oil	0.71 - 8.00% w/v
	Capsicum Tincture	4.00 - 8.00% v/v
	Myrrh Tincture	1.00% w/v
	Ratanghia Tincture	0.40% v/v
	Terpinol	3.33% v/v
	Thymol	0.10% w/v
	Camphor Spirit	3.00% v/v
	Borneo Camphor	9.00% w/v
	Bornyl Acetate	0.42% w/v
	Linalyl Acetate	0.47% w/v
	Phenyl Salicylate	0.60% w/v
	Standard Chamomile Extract	10.00% w/v
สรรพคุณ	บรรเทาอาการคัดจมูก หายใจไม่ออก และบรรเทาอาการ วิงเวียนศีรษะ	
ขนาดและวิธีใช้	ใช้สูดดม หรือทาบาง ๆ ตามคอและหน้าอก	
คำเตือนบนฉลาก	ห้ามรับประทาน	
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา	
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๔ มิลลิลิตร (หมายเหตุ สามารถทำในรูปยาสูดดมหรือยาน้ำสำหรับสูดดม)	

(๘.๓) ยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขี้ผึ้ง

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่ Menthol 1.35 - 3.00% w/w Camphor 3.00 - 9.00% w/w Cajuput Oil 3.00% w/w Eucalyptus Oil 0.08 - 5.00% w/w Turpentine Oil 4.68 - 5.00% w/w
สรรพคุณ	บรรเทาอาการคัดจมูกและลดอาการอื่นเนื่องจากหวัด
ขนาดและวิธีใช้	ทายาที่บริเวณลำคอ หน้าอกและหลัง
คำเตือนบนฉลาก	ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๕๐ กรัม

กลุ่มที่ ๙ ยาแก้เมารถ เมาเรือ (๑ รายการ)

(๙.๑) ยาเม็ดแก้เมารถ เมาเรือ โดเมนไฮดรีเนท

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Dimenhydrinate 50 mg.
สรรพคุณ	ใช้ป้องกันอาการเมารถ เมาเรือ
ขนาดและวิธีใช้	ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด ก่อนออกเดินทางอย่างน้อย ๓๐ นาที
คำเตือนบนฉลาก	ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี้นานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๒ เม็ด

กลุ่มที่ ๑๐ ยาสำหรับโรคตา (๑ รายการ)

(๑๐.๑) ยาล้างตา

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Sodium Chloride ใส่ Preservative ที่เหมาะสมสำหรับ ใช้กับยาตา ได้แก่ Benzalkonium Chloride 0.002 - 0.020% w/v หรือ Chlorhexidine (Gluconate หรือ Acetate) 0.01% w/v ปรับ pH 6 - 8 ด้วย Buffer ที่เหมาะสม และปรับน้ำยาให้เป็น Isotonic กับน้ำตา
สรรพคุณ	ใช้ล้างตาเพื่อบรรเทาอาการแสบตา ระคายเคืองตา อันเนื่องมาจาก ผง ควีน สิ่งสกปรก เข้าตา
ขนาดและวิธีใช้	ใช้ล้างตาวันละ ๒ - ๓ ครั้ง
คำเตือนบนฉลาก	ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๒๔๐ มิลลิลิตร

กลุ่มที่ ๑๑ ยาสำหรับโรคปาก และลำคอ (๕ รายการ)

(๑๑.๑) ยากวาดคอ

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Potassium Iodide 2.50 g. Iodine 1.25 g. Ethyl Alcohol (90 percent) 4.00 ml. Purified Water 2.50 ml. Peppermint Oil 0.40 ml. Glycerin to 100.00 ml.
สรรพคุณ	บรรเทาอาการอักเสบ และเจ็บในลำคอ
ขนาดและวิธีใช้	เติมน้ำสะอาดเท่าตัวแล้วใช้กวาดคอในผู้ใหญ่
คำเตือนบนฉลาก	ใช้สำหรับกวาดในคอเท่านั้น
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๕ มิลลิลิตร

(๑๑.๒) ยาเย็นเขียนไวโอเล็ต

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Gentian Violet 1% w/v
สรรพคุณ	ใช้ทาแผลภายนอกที่เกิดจากเชื้อรา หรือใช้รักษาการติดเชื้อราที่ลิ้นและกระพุ้งแก้ม ในระยะสั้น
ขนาดและวิธีใช้	ใช้สำหรับชุบยาทาตามบริเวณที่เป็น วันละ ๒ - ๓ ครั้ง
คำเตือนบนฉลาก	ใช้สำหรับทาแผลที่ผิวหนัง หรือที่ลิ้นและกระพุ้งแก้ม เท่านั้น
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๓๐ มิลลิลิตร

(๑๑.๓) ยาแก้ปวดฟัน

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Chlorobutanol 25 g. Clove Oil to 100 ml.
สรรพคุณ	บรรเทาอาการปวดฟัน
ขนาดและวิธีใช้	ใช้ไม้เล็ก ๆ พันสำหรับยาอุดฟันตรงที่เป็นรู
คำเตือนบนฉลาก	๑) ระวังอย่าให้ถูกบริเวณอื่น ๒) ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาทันตแพทย์
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๘ มิลลิลิตร ทั้งนี้ อาจมีอุปกรณ์ในการใช้ยาด้วยก็ได้

(๑๑.๔) ยาอมบรรเทาอาการระคายคอ

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่ Abietis Pine Oil 0.30% v/w Anise Oil 0.25% w/w Borneol 1.66 - 2.00% w/w Cinnamon Oil 0.35% w/w Creosote 0.20% v/w Eucalyptus Oil 0.15 - 0.16% w/w Lemon Oil 0.30 - 0.52% v/w Menthol 0.06 - 5.00% w/w Peppermint Oil 0.19 - 3.33% w/w Sylvestris Pine Oil 0.30% v/w Licorice Extract 7.31 - 16.67% w/w Tincture Capsicum 0.02% w/w Amomum 1.00 - 4.00% w/w Aniseed 2.00% w/w Catechu 8.33 - 38.00% w/w Cinnamon 2.00 - 10.00% w/w
---------	--

กลุ่มที่ ๑๒ ยาใส่แผล ล้างแผล (๗ รายการ)

(๑๒.๑) ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไอโอดีน

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Iodine 2.0 - 2.5% w/v Potassium Iodide 2.4 - 2.5% w/v
สรรพคุณ	รักษาแผลสด
ขนาดและวิธีใช้	ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล
คำเตือนบนฉลาก	๑) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา ๒) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๓๐ มิลลิลิตร

(๑๒.๒) ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไทเมอรอล

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Thimerosal 0.1% w/v
สรรพคุณ	รักษาบาดแผล
ขนาดและวิธีใช้	ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล
คำเตือนบนฉลาก	๑) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา ๒) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๓๐ มิลลิลิตร

(๑๒.๓) ยาใส่แผล โปวิดอน - ไอโอดีน

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Povidone - Iodine 10% w/v equivalent to Iodine 1% w/v
สรรพคุณ	รักษาแผลสด
ขนาดและวิธีใช้	ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล
คำเตือนบนฉลาก	๑) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา ๒) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๒๐ มิลลิลิตร ทั้งนี้ อาจมีอุปกรณ์ในการใช้ยาด้วย หรือมีภาชนะบรรจุยาที่มีอุปกรณ์พร้อมใช้ในลักษณะใช้ครั้งเดียว (unit dose) โดยปรับวิธีการใช้ให้เหมาะสมตามรูปแบบของขนาดบรรจุก็ได้

(๑๒.๔) ยาไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Isopropyl Alcohol Solution 70% v/v โดยสูตรตำรับต้องแต่งสีด้วย Brilliant Blue C.I. No.42090
สรรพคุณ	ทำความสะอาดบาดแผล
ขนาดและวิธีใช้	ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผล
คำเตือนบนฉลาก	ห้ามรับประทาน

การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๔๕๐ มิลลิลิตร

(๑๒.๕) ยาเอทิล แอลกอฮอล์

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Ethyl Alcohol Solution 70% v/v โดยสูตรตำรับต้องแต่งสีด้วย Brilliant Blue C.I. No.42090
สรรพคุณ	ทำความสะอาดบาดแผล
ขนาดและวิธีใช้	ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผล
คำเตือนบนฉลาก	ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๔๕๐ มิลลิลิตร

(๑๒.๖) น้ำเกลือล้างแผล

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Sodium Chloride 0.9% w/v
สรรพคุณ	ทำความสะอาดบาดแผล
ขนาดและวิธีใช้	ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
คำเตือนบนฉลาก	-
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑ ลิตร

(๑๒.๗) น้ำยาฆ่าเชื้อโรคคลอโรไซลีนอล

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วย Chloroxylenol 4.8% w/v Isopropyl Alcohol Solution 12% v/v
สรรพคุณ	ทำความสะอาดรอบบาดแผล
ขนาดและวิธีใช้	ห้ามใส่แผลโดยตรง เจือจางน้ำยา ๑ ส่วนกับน้ำ ๑๙ ส่วน ใช้เช็ดทำความสะอาดรอบบาดแผล
คำเตือนบนฉลาก	ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๔๕๐ มิลลิลิตร

กลุ่มที่ ๑๓ ยารักษาแผลติดเชื้อ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก (ไม่มีรายการ)

กลุ่มที่ ๑๔ ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ แผลงกัดต้อย (๑ รายการ)

(๑๔.๑) ยาหม่อง ชนิดขี้ผึ้ง

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract หนึ่ง หรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่ Methyl Salicylate 1.14 - 50.00% w/w Camphor 1.76 - 25.00% w/w Menthol 3.00 - 20.00% w/w Cinnamon Oil 1.00 - 2.40% w/w Clove Oil 0.50 - 5.00% v/w Eucalyptus Oil 1.50 - 13.70% v/w Peppermint Oil 0.70 - 16.00% w/w Turpentine Oil 2.00 - 3.80% v/w Capsicum Tincture 0.80 - 8.00% v/v Colophony 2.51% v/w
สรรพคุณ	บรรเทาอาการปวด บวม อักเสบ เนื่องจากแผลงกัดต้อย หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ขนาดและวิธีใช้	ทาและนวดบริเวณที่มีอาการ
คำเตือนบนฉลาก	ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๓๐ กรัม

กลุ่มที่ ๑๕ ยาสำหรับโรคผิวหนัง (๖ รายการ)

(๑๕.๑) ยารักษาหิดเหา เบนซิล เบนโซเอต

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Benzyl Benzoate 25% w/v
สรรพคุณ	รักษาหิด เหา และโลน
ขนาดและวิธีใช้	เขย่าขวดก่อนใช้ยา สำหรับเด็กเล็กให้แบ่งยามาเติมน้ำเท่าตัวแล้วผสมให้เข้ากัน สำหรับรักษาหิด อาบน้ำให้สะอาด ใช้ผ้าหรือแปรงอ่อนๆ ถูตรงบริเวณที่มีผื่นคันแล้วทายานี้ให้ทั่วทั้งไว้ ๒๔ ชั่วโมง แล้วจึงอาบน้ำ วันรุ่งขึ้นให้ทาซ้ำใหม่อีกครั้งตามวิธีเดิม สำหรับรักษาเหาและโลน ใส่ยานี้ให้ทั่วศีรษะหรือบริเวณที่มีเหาหรือโลน ทิ้งไว้ ๑ วัน ถ้าเป็นมากให้ใช้ยา ๒ ครั้ง ต่อวัน วันต่อมาจึงสระให้สะอาด เมื่อครบ ๗ วันให้ตรวจดูอีก ครั้งหนึ่ง ถ้ายังไม่หาย ให้ใส่ยาซ้ำตามวิธีเดิม
คำเตือนบนฉลาก	ระวังอย่าให้ยาเข้าตา
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๖๐ มิลลิลิตร

(๑๕.๒) ยารักษาหิด ขี้ผึ้งกำมะถัน

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Sublimed Sulphur 10% w/w
สรรพคุณ	รักษาโรคหิด
ขนาดและวิธีใช้	ใช้ทาบริเวณที่เป็นหิด วันละ ๒ - ๓ ครั้ง
คำเตือนบนฉลาก	ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังให้หยุดใช้ยา
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๕ กรัม

(๑๕.๓) ยารักษากลากเกลื้อน น้ำกัดเท้า

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Benzoic Acid 2.5 - 6.5% w/w Salicylic Acid 3.0 - 5.0% w/w
สรรพคุณ	รักษา กลากเกลื้อน และโรคน้ำกัดเท้า
ขนาดและวิธีใช้	ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรค วันละ ๒ - ๓ ครั้ง
คำเตือนบนฉลาก	ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังให้หยุดใช้ยา
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๕ กรัม

(๑๕.๔) ยารักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Coal Tar 1% w/w
สรรพคุณ	รักษาโรคผิวหนังเรื้อรังบางชนิด เช่น เรื้อนกวาง ผื่นหนังเป็นผื่นคัน
ขนาดและวิธีใช้	ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรค วันละ ๒ - ๓ ครั้ง
คำเตือนบนฉลาก	ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังให้หยุดใช้ยา
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๕ กรัม

(๑๕.๕) ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน์

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Calamine 8 - 15% w/v Zinc Oxide 3 - 12% w/v
สรรพคุณ	บรรเทาอาการผดผื่นคัน ระคายเคืองผิวหนัง ที่อาการไม่รุนแรง และไม่ควรรใช้กับผู้ป่วยที่มี ผิวแห้ง
ขนาดและวิธีใช้	เขย่าขวดก่อนใช้ยา ทาบริเวณที่เป็นวันละ ๓ - ๔ ครั้ง
คำเตือนบนฉลาก	ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิลิตร

(๑๕.๖) ยารักษาเกลื้อน โซเดียม ไทโอซัลเฟต

ตำรับยา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Sodium Thiosulfate 100% w/w
สรรพคุณ	รักษาเกลื้อน
ขนาดและวิธีใช้	เติมน้ำสะอาดจนถึงคอขวด เขย่าผสมกันจนตัวยาละลายหมด (จะได้ความเข้มข้นประมาณ 25%) ใช้ทาบริเวณที่เป็นเกลื้อน หลังอาบน้ำ วันละหลายครั้ง
คำเตือนบนฉลาก	ยาที่ผสมน้ำแล้วควรใช้ภายใน ๑๕ วัน
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๕ กรัม ทั้งนี้ ให้ปรับสัดส่วนการผสมน้ำให้เหมาะสมตามขนาดบรรจุ

กลุ่มที่ ๑๖ ยาบำรุงร่างกาย (๖ รายการ)

(๑๖.๑) ยาวิตามินบีรวม ชนิดเม็ดและแคปซูล

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ สำหรับเด็กอายุ ๙ - ๑๘ ปี ประกอบด้วยตัวยาสำคัญและขนาดยาต่อวัน คือ Vitamin B1 1.2 - 100 mg. ต่อวัน Vitamin B2 1.3 - 100 mg. ต่อวัน Vitamin B6 1.3 - 60 mg. ต่อวัน Vitamin B12 2.4 - 1000 mcg. ต่อวัน Folic acid 300 - 600 mcg. ต่อวัน Niacinamide 16 - 20 mg. ต่อวัน Pantothenic acid 5 - 500 mg. ต่อวัน Biotin 25 - 500 mcg. ต่อวัน หรือในสูตรตำรับ สำหรับผู้ใหญ่ อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ประกอบด้วยตัวยาสำคัญและขนาดยาต่อวัน คือ Vitamin B1 1.2 - 100 mg. ต่อวัน Vitamin B2 1.3 - 100 mg. ต่อวัน Vitamin B6 1.3 - 100 mg. ต่อวัน Vitamin B12 2.4 - 1000 mcg. ต่อวัน Folic acid 300 - 1000 mcg. ต่อวัน Niacinamide 16 - 35 mg. ต่อวัน Pantothenic acid 5 - 500 mg. ต่อวัน Biotin 30 - 500 mcg. ต่อวัน
สรรพคุณ	๑. รักษาผู้ที่มีภาวะขาดวิตามินบี ๒. รักษาผู้ที่ขาดสารอาหารหรือรับประทานอาหารไม่เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงการขาดวิตามินบี ๓. ใช้บำรุงร่างกาย ๔. เสริมสร้างสุขภาพหรือการเจริญเติบโตของร่างกาย
ขนาดและวิธีใช้	ปริมาณวิตามินในสูตรตำรับต้องไม่เกินปริมาณสูงสุดต่อวัน เป็นไปตามความเห็นชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์

คำเตือนบนฉลาก	๑. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบของตำรับยานี้ ๒. หากมีอาการแพ้ มีผื่นคัน หน้าบวม ตาบวม หายใจลำบาก ตุ่มพอง ผิวน้ำตาลลอก ให้หยุดยาทันทีและไปพบแพทย์ ๓. อาจทำให้ปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มกว่าปกติ ซึ่งเป็นสีของวิตามินบีสองและไม่เป็นอันตราย
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๐ เม็ด

(๑๖.๒) ยาเม็ดวิตามินซี

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Ascorbic Acid 100 mg.
สรรพคุณ	ป้องกันการขาดวิตามินซี
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานวันละ ๑ ครั้ง ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๒ เม็ด เด็ก ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด
คำเตือนบนฉลาก	ห้ามใช้เมื่อเม็ดยาเปลี่ยนสี
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๐ เม็ด

(๑๖.๓) ยาเม็ดบำรุงโลหิต เฟอรัส ซัลเฟต

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Ferrous Sulfate Equivalent to Iron 60 mg.
สรรพคุณ	รักษาโรคโลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็กในผู้ใหญ่
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร
คำเตือนบนฉลาก	๑) ในช่วงรับประทานยาอาจจะจะมีสีดำ ๒) หากเกิดอาการไม่สบายท้อง คลื่นไส้ ควรรับประทานยาพร้อมอาหารหรือค่อย ๆ เพิ่มขนาดของยาจนถึงขนาดที่แนะนำให้ใช้
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๐ เม็ด

(๑๖.๔) ยาวิตามินรวม ชนิดเม็ดและแคปซูล

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ สำหรับเด็ก อายุ ๙ - ๑๘ ปี ประกอบด้วยตัวยาสำคัญและขนาดยาต่อวัน คือ	
	Vitamin A	2,000 - 5,600 I.U. ต่อวัน
	Vitamin D	600 - 4,000 I.U. ต่อวัน
	Vitamin B1	1.2 - 100 mg. ต่อวัน
	Vitamin B2	1.3 - 100 mg. ต่อวัน
	Vitamin B6	1.3 - 60 mg. ต่อวัน
	Vitamin B12	2.4 - 1,000 mcg. ต่อวัน
	Niacinamide	16 - 20 mg. ต่อวัน
	Folic acid	300 - 600 mcg. ต่อวัน
	Vitamin C	100 - 1,000 mg. ต่อวัน

	หรือในสูตรตำรับ สำหรับผู้ใหญ่ อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ประกอบด้วยตัวยาสําคัญและขนาดยาต่อวัน คือ Vitamin A 2,000 - 5,600 I.U. ต่อวัน Vitamin D 600 - 4,000 I.U. ต่อวัน Vitamin B1 1.2 - 100 mg. ต่อวัน Vitamin B2 1.3 - 100 mg. ต่อวัน Vitamin B6 1.3 - 100 mg. ต่อวัน Vitamin B12 2.4 - 1,000 mcg. ต่อวัน Niacinamide 16 - 35 mg. ต่อวัน Folic acid 300 - 1,000 mcg. ต่อวัน Vitamin C 100 - 1,000 mg. ต่อวัน
สรรพคุณ	๑. รักษาผู้ที่มีภาวะขาดวิตามิน ๒. รักษาผู้ที่ขาดสารอาหารหรือรับประทานอาหารไม่เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงการขาดวิตามิน ๓. ใช้บำรุงร่างกาย ๔. เสริมสร้างสุขภาพหรือการเจริญเติบโตของร่างกาย
ขนาดและวิธีใช้	ปริมาณวิตามินในสูตรตำรับต้องไม่เกินปริมาณสูงสุดต่อวัน เป็นไปตามความเห็นชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
คำเตือนบนฉลาก	๑. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบของตำรับยานี้ ๒. หากมีอาการแพ้ มีผื่นคัน หน้าบวม ตาบวม หายใจลำบาก ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก ให้หยุดยาทันทีและไปพบแพทย์ ๓. อาจทำให้ปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มกว่าปกติ ซึ่งเป็นสีของวิตามินบีสองและไม่เป็นอันตราย ๔. ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรใช้ยาเกินขนาดที่กำหนดไว้ หรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน นอกจากแพทย์สั่ง
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๐ เม็ด

(๑๖.๕) น้ำมันตับปลาชนิดแคปซูล

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๑ แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Cod Liver Oil equivalent to Vitamin A ไม่เกิน 4,000 I.U. Vitamin D ไม่เกิน 300 I.U.
สรรพคุณ	ป้องกันการขาดวิตามิน A และ D
ขนาดและวิธีใช้	ผู้ใหญ่รับประทานวันละ ๑ เม็ด
คำเตือนบนฉลาก	ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรใช้เกินขนาดที่กำหนดไว้ หรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน นอกจากแพทย์สั่ง
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๐ เม็ด

(๑๖.๖) น้ำมันตับปลาชนิดน้ำ

ตำรับยา	ในสูตรตำรับ ๕ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Cod Liver Oil equivalent to Vitamin A ไม่เกิน 4,000 I.U. Vitamin D ไม่เกิน 300 I.U.
สรรพคุณ	ป้องกันการขาดวิตามิน A และ D
ขนาดและวิธีใช้	เขย่าขวดก่อนใช้ เด็กอายุตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไป รับประทานวันละ ๑ ช้อนชา เด็กอายุ ๑ - ๔ ปี รับประทานวันละ ครึ่ง ช้อนชา เด็กแรกเกิด - ๑ ปี รับประทานวันละ หนึ่งส่วนสี่ ช้อนชา
คำเตือนบนฉลาก	ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรใช้เกินขนาดที่กำหนดไว้ หรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน นอกจากแพทย์สั่ง
การเก็บรักษา	ตามข้อมูลความคงสภาพของทะเบียนตำรับยา
ขนาดบรรจุ	ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๔๐๐ มิลลิลิตร

ภาคผนวก ๒

แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๘

ยาลดกรด

อะลูมินา-แมกนีเซียม

ชนิดเม็ดและชนิดน้ำแขวนตะกอน [ข้อควรคำ ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (aluminium hydroxide) และ แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (magnesium hydroxide)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ และปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต
- รู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียมาก ไม่มีแรง
- มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง
- มีภาวะลำไส้ตีบตัน หรืออุดตัน

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีอาการต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- หญิงตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- กินภายใน 20 นาที ถึง 1 ชั่วโมงหลังอาหาร และก่อนนอน หรือเมื่อมีอาการ

ยาเม็ด: เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน

ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1-4 เม็ด

เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 1-2 เม็ด

ยาน้ำ: เขย่าขวดก่อนใช้ยา

ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1-4 ช้อนชา

เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 1-2 ช้อนชา

เด็ก 3-6 ปี: กินครั้งละ 0.5-1 ช้อนชา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ไม่ควรใช้ยานี้มากกว่า 2 สัปดาห์ หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ห้ามกินยานี้พร้อมกับยาอื่น หรือควรกินยานี้ห่างจากยาอื่นอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](#)
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ [อย.](#)

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ท้องผูกหรือท้องเสีย

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

ลักษณะยาเม็ด: ยาเม็ดกลมสีขาว หรือสีขาวหม่น
ด้วยสำคัญ:

- อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์
- แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์

ขนาดบรรจุ:

- ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 10 เม็ด (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

ลักษณะยาน้ำ: ยาน้ำแขวนตะกอนมีสีขาวขุ่น
ด้วยสำคัญ:

- อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์
- แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์

ขนาดบรรจุ:

- ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 450 มิลลิลิตร (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดาเม็ท ชนิดเม็ด [ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า โซดาเม็ท ประกอบด้วยตัวยา โซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) และ น้ำมันหอมระเหยเปปเปอร์มินต์ (peppermint oil)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการจุกเสียด ลดอาการระคายเคืองเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคหัวใจ
- เป็นโรคไต หรือ โรคตับ
- เป็นโรคความดันเลือดสูง
- มีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ
- มีภาวะเลือดเป็นด่างสูง
- กำลังใช้ยาสเตอรอยด์

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- หญิงตั้งครรภ์ หรือ อยู่ระหว่างให้นมลูก

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 3-6 เม็ด
- เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 1-3 เม็ด
- กินหลังอาหาร วันละ 3 ครั้ง หรือเมื่อมีอาการ

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากไม่มีอาการของโรคแล้ว สามารถหยุดยาได้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ไม่ควรใช้ยานี้นานกว่า 2 สัปดาห์ หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](#)
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ [อย.](#)

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- บวมหน้า

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ ยกเว้นกรณีมีอาการรุนแรง

- ปวดท้อง ใดๆ ที่ท้อง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาเม็ด
- ตัวยาสำคัญ:
 - โซเดียมไบคาร์บอเนต 300 มิลลิกรัม
 - น้ำมันหอมระเหยเปปเปอร์มินต์ 0.003 มิลลิลิตร
- ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 10 เม็ด (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

ยาขับลม ชนิดน้ำ

[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาขับลม ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ ทิงเจอร์กระวานเทศ (compound cardamom tincture) ทิงเจอร์พริกสกัดเข้มข้น (strong capsicum tincture) และ ทิงเจอร์ขิงสกัดเข้มข้น (strong ginger tincture)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ และขับลมในกระเพาะอาหาร

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวัง

- ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะในเด็ก และหญิงตั้งครรภ์

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ
- เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 1/2 หรือ 1 ช้อนโต๊ะ
- กินวันละ 3-4 ครั้ง
- เขย่าขวดก่อนใช้ยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากไม่มีอาการของโรคแล้วสามารถหยุดยาได้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาดิด้ตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ไม่ควรรับประทานยานี้เป็นเวลานานเกินกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง
- ยานี้ไม่ใช่ยารักษาโรคกระเพาะ เพียงแต่ช่วยบรรเทาอาการให้ดีขึ้นเท่านั้น

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้าอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติรุนแรงใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่านำให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาน้ำใสสีแสด
- ตัวยาสำคัญใน 15 มิลลิลิตร:
 - ทิงเจอร์กระวานเทศ 0.035-1.8 มิลลิลิตร
 - ทิงเจอร์พริกสกัดเข้มข้น 0.06-0.5 มิลลิลิตร
 - ทิงเจอร์ขิงสกัดเข้มข้น 0.024-0.2 มิลลิลิตร
- ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 450 มิลลิลิตร (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง ชนิดน้ำ [ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือโซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) และ ทิงเจอร์โกศน้ำเต้า (compound rhubarb tincture)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดท้องเนื่องจากจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคหัวใจ
- เป็นโรคไต

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออก แพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- ผู้ป่วยที่ต้องจำกัดปริมาณโซเดียม
- หญิงตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ
- เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 1/2 หรือ 1 ช้อนโต๊ะ
- กินยาก่อนอาหาร วันละ 3 ครั้ง
- เขย่าขวดก่อนใช้ยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากไม่มีอาการของโรคแล้ว สามารถหยุดยาได้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการ เดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ไม่ควรใช้ยานี้เป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจาก แพทย์สั่ง
- ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](#)
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ [อย.](#)

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์

ยกเว้นกรณีมีอาการรุนแรง

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติรุนแรงใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่ อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตาม ทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาน้ำมีสีเข้ม
- ตัวยาสำคัญใน 15 มิลลิลิตร:
 - โซเดียมไบคาร์บอเนต 0.15-0.6 กรัม
 - ทิงเจอร์โกศน้ำเต้า 0.5-2 มิลลิลิตร
- ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ทิงเจอร์กระวานเทศ, ทิงเจอร์ซิงส์กัต, เหล้าสาระแทน เป็นต้น
- ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 450 มิลลิลิตร (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

ยาน้ำแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
โซเดียมไบคาร์บอเนต
ชนิดน้ำ
[ข้อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า โซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคหัวใจ
- เป็นโรคไต หรือ โรคตับ
- เป็นโรคความดันเลือดสูง
- มีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ
- มีภาวะเลือดเป็นด่างสูง
- กำลังใช้ยาสเตอรอยด์

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้ป้อนให้เด็กหรือทารกหลังอาหาร หรือเมื่อมีอาการ
- เด็ก 1-6 เดือน: กินครั้งละ 1 ช้อนชา
- เด็ก 6-12 เดือน: กินครั้งละ 2 ช้อนชา
- เด็ก 2-3 ปี: กินครั้งละ 2-3 ช้อนชา
- กินวันละ 6 ครั้ง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากไม่มีอาการของโรคแล้ว สามารถหยุดยาได้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ไม่ควรใช้ยานี้มากกว่า 2 สัปดาห์ หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](#)

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ [อย.](#)

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- บวมหน้า

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้าอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติรุนแรงใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ ให้รีบไปพบแพทย์

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาน้ำใสไม่มีสี
- ตัวยาสสำคัญใน 5 มิลลิลิตร: โซเดียมไบคาร์บอเนต 50 มิลลิกรัม
- ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 60 มิลลิลิตร (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
ทิงเจอร์มหาหิงค์
ชนิดน้ำ
[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ทิงเจอร์มหาหิงค์ (asafoetida tincture)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้องในเด็ก

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ทาบาง ๆ ที่หน้าท้อง วันละ 2-3 ครั้ง
- ไม่ควรให้เด็กกินยานี้ เพราะทิงเจอร์มหาหิงค์มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ซึ่งอาจจะมีผลเสียต่อเด็ก

3.2 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ควรทายาด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปาก หรือเข้าตา เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้าอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติรุนแรงใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาน้ำมีสีเข้ม
- ตัวยาสำคัญ: มหาหิงค์ 20%โดยมวลต่อปริมาตร
- ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 60 มิลลิลิตร (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

ยาลดกรด

อะลูมินา-แมกนีเซียม-ไซเมธิโคน
ชนิดเม็ดและชนิดน้ำแขวนตะกอน
[ข้อควรคำ ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ (aluminium hydroxide) และ แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (magnesium hydroxide) และไซเมธิโคน (simethicone)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ และปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ และช่วยขับลม

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต
- รู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียมาก ไม่มีแรง
- มีภาวะฟอสเฟตในเลือดต่ำ

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออก แพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- หญิงมีครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- กินภายใน 20 นาที ถึง 1 ชั่วโมงหลังอาหาร และก่อนนอน หรือเมื่อมีอาการ
- ยาเม็ด: เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน
 - ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1-4 เม็ด
 - เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 1-2 เม็ด
- ยาน้ำ: เขย่าขวดก่อนใช้ยา
 - ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1-4 ช้อนชา
 - เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 1-2 ช้อนชา
 - เด็ก 3-6 ปี: กินครั้งละ 0.5-1 ช้อนชา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ไม่ควรใช้ยานี้มากกว่า 2 สัปดาห์ หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ห้ามกินยาพร้อมกับยาอื่น ควรกินยานี้ห่างจากยาอื่น 2 ชั่วโมง เพราะยานี้อาจจะตีกันกับยาอื่น

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์แต่ ถ้าอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันที

- ท้องผูกหรือท้องเสีย

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาเม็ด หรือ ยาน้ำมีสีขาวขุ่น
- ตัวยาสาคัญ: อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ และไซเมธิโคน
- ขนาดบรรจุ:
 - ยาเม็ด ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 10 เม็ด (ตามที่ขึ้นทะเบียน)
 - ยาน้ำ ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 450 มิลลิลิตร (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](#)
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ [อย.](#)

ยาผงฟูชนิดกรดซิตริก-โซเดียมไบคาร์บอเนต-โซเดียมคาร์บอเนต
ชนิดผงฟูละลายน้ำ
[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ซิตริกแอซิด (citric acid anhydrous) โซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) และ โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อลดกรด บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคหัวใจ
- เป็นโรคไต หรือ โรคตับ
- เป็นโรคความดันเลือดสูง
- อายุต่ำกว่า 12 ปี (ยกเว้นแพทย์สั่ง)

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- หญิงตั้งครรภ์ หรือ อยู่ระหว่างให้นมลูก

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผสมน้ำก่อนแก้วรับประทาน หลังหมดฟองฟู
- ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป กินครั้งละ 1 ชวง
- กินซ้ำได้อีกภายใน 2-3 ชั่วโมง ถ้าต้องการ

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากไม่มีอาการแล้ว สามารถหยุดยาได้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- หากใช้ยาแล้วยังคงมีอาการหรืออาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ไม่ควรใช้ยานี้นานกว่า 2 สัปดาห์

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ อย.

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- บวมหน้า

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ แต่ถ้าอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดท้อง ๆ ที่ท้อง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ผงมีสีอ่อน ๆ หรือสีขาว
- ตัวอย่างสำคัญ:
 - ซิตริกแอซิด ไม่เกิน 1.85 กรัม
 - โซเดียมไบคาร์บอเนต ไม่เกิน 1.96 กรัม
 - โซเดียมคาร์บอเนต ไม่เกิน 0.43 กรัม
- ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 4.3 กรัม (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

ไซเมธิโคน

ความแรง 40 และ 80 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด

[ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ไซ-เม-ธิ-โคน (simethicone)
- เป็นยาในกลุ่ม ยาขับลม

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียดเนื่องจากมีแก๊สในทางเดินอาหาร ในผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะลำไส้อุดตัน หรือลำไส้ทะลุ

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่
- ตั้งท้อง วางแผนตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- เคี้ยวยาก่อนกลืน
- ขนาด 40 มิลลิกรัม กินครั้งละ 1-2 เม็ด เมื่อมีอาการวันละ 4 ครั้ง (ไม่เกินวันละ 12 เม็ด)
- ขนาด 80 มิลลิกรัม กินครั้งละ 1 เม็ด เมื่อมีอาการวันละ 4 ครั้ง (ไม่เกินวันละ 6 เม็ด)

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการอยู่ สามารถกินยาได้ทันที
- ไม่แนะนำให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ถ้าอาการของโรคไม่ดีขึ้นภายใน 3 วัน หรือมีอาการรุนแรงขึ้นควรไปพบแพทย์
- บอกชื่อยานี้ให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ ทุกครั้งที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาล คลินิก หรือร้านยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน
- ท้องเสีย ปวดท้อง
- เรอ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นเม็ด บรรจุในแผง
- **ตัวยาสําคัญ** คือ ไซเมธิโคน ความแรง 40 และ 80 มิลลิกรัม

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดเม็ด

อาการแสบหรือเจ็บหน้าอกอาจเป็นอาการของโรคหัวใจ ซึ่งเป็นอันตรายรุนแรงถึงชีวิต หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัย ควรปรึกษาแพทย์

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ใน 1 เม็ด มีตัวยาไซเตียมแอลจินेट 250 มิลลิกรัม ไซเตียมไบคาร์บอเนต 133.5 มิลลิกรัม และแคลเซียมคาร์บอเนต 80 มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

เพื่อบรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณกลางอก ร่วมกับเรอเปรี้ยว และอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยานี้ อาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้น เช่น หายใจลำบาก ผื่นลมพิษ
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีสภาวะฟีนิลคีโตนูเรีย ยานี้มีส่วนประกอบของแอสปาแตม (ถ้ามี)

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
- หากกินยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงให้หยุดยาและไปพบแพทย์ทันที

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป กินครั้งละ 2-4 เม็ด วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
- เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน

3.2 หากลืมหากินยา ควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมหากินยา ไม่จำเป็นต้องกินเพิ่มเป็น 2 เท่าในครั้งต่อไป ให้กินยาในขนาดปกติ

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ในกรณีผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคไต ที่กินยามากเกินไปหากมีอาการท้องอืด อาจทำให้เกิดอันตราย ให้พบแพทย์ทันที
- ถ้ากินยานี้มากเกินไป อาจทำให้รู้สึกท้องอืด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ในกรณีที่กินยานี้ร่วมกับยาอื่น เช่น เตตราไซคลิน (tetracyclines), ฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolones), เกลือของธาตุเหล็ก (iron salts), ไทรอยด์ฮอร์โมน (thyroid hormones), คลอโรควิน (chloroquine), บิสฟอสโฟเนต (bisphosphonates) และเอสตรามัสทีน (estramustine) ควรกินห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคกรดไหลย้อน หลีกเลี่ยงการกินอาหารมัน หรืออาหารลดจัด งดการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที หากมีอาการแพ้ต่อส่วนประกอบในยา และเกิดอาการต่อไปนี้

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีน้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ให้เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- ไม่ควรโดนแสงแดด
- ไม่เก็บยาในตู้เย็น
- ไม่เก็บยาในที่ชื้น

ผู้ผลิต

ผู้นำเข้า

ผู้แทนจำหน่าย (ถ้ามี)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำ

อาการแสบหรือเจ็บหน้าอกอาจเป็นอาการของโรคหัวใจ ซึ่งเป็นอันตรายรุนแรงถึงชีวิต หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัย ควรปรึกษาแพทย์

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ใน 10 มิลลิลิตร มีตัวยาโซเดียมแอลจินเนต 500 มิลลิกรัม โซเดียมไบคาร์บอเนต 267 มิลลิกรัม และแคลเซียมคาร์บอเนต 160 มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

เพื่อบรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณกลางอก ร่วมกับเรอเปรี้ยว และอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยานี้ อาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้น เช่น หายใจลำบาก ผื่นลมพิษ
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีสภาวะฟีนิลคีโตนูเรีย ยานี้มีส่วนประกอบของแอสปาแตม (ถ้ามี)

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
- หากกินยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้หยุดยาและไปพบแพทย์ทันที

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป กินครั้งละ 10-20 มิลลิลิตร (2-4 ช้อนชา) วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
- เขย่าขวด/ชงก่อนใช้ยา

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมกินยา ไม่จำเป็นต้องกินเพิ่มเป็น 2 เท่าในครั้งต่อไป ให้กินยาในขนาดปกติ

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ในกรณีผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคไต ที่กินยามากเกินไป หากมีอาการท้องอืด อาจทำให้เกิดอันตราย ให้พบแพทย์ทันที
- ถ้ากินยานี้มากเกินไป อาจทำให้รู้สึกท้องอืด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ในกรณีที่กินยาร่วมกับยาอื่น เช่น เตตราไซคลิน (tetracyclines), ฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolones), เกลือของธาตุเหล็ก (iron salts), ไทรอยด์ฮอร์โมน (thyroid hormones), คลอโรควิน (chloroquine), บิสฟอสโฟเนต (bisphosphonates) และเอสตรามัสทีน (estramustine) ควรกินห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคกรดไหลย้อน หลีกเลี่ยงการกินอาหารมัน หรืออาหารลดจัด งดการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที หากมีอาการแพ้ต่อส่วนประกอบในยา และเกิดอาการต่อไปนี้

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ให้เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- ไม่ควรโดนแสงแดด
- ไม่เก็บยาในตู้เย็น
- ไม่เก็บยาในที่ชื้น

ผู้ผลิต

ผู้นำเข้า

ผู้แทนจำหน่าย (ถ้ามี)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอก
อาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน
และลดกรดในกระเพาะอาหาร
ชนิดเม็ด

อาการแสบหรือเจ็บหน้าอกอาจเป็นอาการ
ของโรคหัวใจ ซึ่งเป็นอันตรายรุนแรงถึงชีวิต
หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัย
ควรปรึกษาแพทย์

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีข้อสำคัญอะไรบ้าง

ใน 1 เม็ด มีตัวยาไซเตียมแอลจินेट 250 มิลลิกรัม
ไซเตียมไบคาร์บอเนต 106.5 มิลลิกรัม และแคลเซียม
คาร์บอเนต 187.5 มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

เพื่อบรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณกลางอก ร่วมกับเรอ
เปรี้ยว และอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน และ
ลดกรดในกระเพาะอาหาร

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยานี้ อาการแพ้ที่อาจ
เกิดขึ้น เช่น หายใจลำบาก ผื่นลมพิษ
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีสภาวะฟีนิลคีโตนูเรีย ยานี้
มีส่วนประกอบของแอสปาแตม (ถ้ามี)

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต ต้องปรึกษาแพทย์ก่อน
ใช้ยานี้
- หากกินยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
ให้หยุดยาและไปพบแพทย์ทันที

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป กินครั้งละ 2-4
เม็ด วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
- เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมกินยา ไม่จำเป็นต้องกินเพิ่มเป็น 2 เท่าในครั้ง
ต่อไป ให้กินยาในขนาดปกติ

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ในกรณีผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคไต ที่กินยามาก
เกินไป หากมีอาการท้องอืด อาจทำให้เกิด
อันตราย ให้พบแพทย์ทันที
- ถ้ากินยานี้มากเกินไป อาจทำให้รู้สึกท้องอืด
ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการ
ผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ในกรณีที่กินยานี้ร่วมกับยาอื่น เช่น เตตราไซคลิน
(tetracyclines), ฟลูออโรควิโนโลน
(fluoroquinolones), เกลือของธาตุเหล็ก (iron
salts), ไทรอยด์ฮอร์โมน (thyroid hormones),
คลอโรควิน(chloroquine), บิสฟอสโฟเนต
(bisphosphonates) และเอส ตรามัสทีน
(estramustine) ควรกินห่างกันอย่างน้อย 2
ชั่วโมง
- เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคกรดไหลย้อน
หลีกเลี่ยงการกินอาหารมัน หรืออาหารลดจ้ด
งดการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที
หากมีอาการแพ้ต่อส่วนประกอบในยา และเกิดอาการ
ต่อไปนี้

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
หรือเลือดออกผิดปกติ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ให้เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- ไม่ควรโดนแสงแดด
- ไม่เก็บยาในตู้เย็น
- ไม่เก็บยาในที่ชื้น

ผู้ผลิต

ผู้นำเข้า

ผู้แทนจำหน่าย (ถ้ามี)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอก
อาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน
และลดกรดในกระเพาะอาหาร
ชนิดน้ำ

อาการแสบหรือเจ็บหน้าอกอาจเป็นอาการ
ของโรคหัวใจ ซึ่งเป็นอันตรายรุนแรงถึงชีวิต
หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัย
ควรปรึกษาแพทย์

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีข้อสำคัญอะไรบ้าง

ใน 10 มิลลิลิตร มีตัวยาโซเดียมแอลจิเนต 500 มิลลิกรัม
โซเดียมไบคาร์บอเนต 213 มิลลิกรัม และแคลเซียม
คาร์บอเนต 325 มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

เพื่อบรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณกลางอก ร่วมกับเรอ
เปรี้ยว และอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน และลด
กรดในกระเพาะอาหาร

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยานี้ อาการแพ้ที่อาจ
เกิดขึ้น เช่น หายใจลำบาก ผื่นลมพิษ
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีสภาวะฟีนิลคีโตนูเรีย ยานี้มี
ส่วนประกอบของแอสปาแตม (ถ้ามี)

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต ต้องปรึกษาแพทย์ก่อน
ใช้ยานี้
- หากกินยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
ให้หยุดยาและไปพบแพทย์ทันที

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป กินครั้งละ 10-20
มิลลิลิตร (2-4 ช้อนชา) วันละ 4 ครั้ง
หลังอาหารและก่อนนอน
- เขย่าขวด/ซองก่อนใช้ยา

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมกินยา ไม่จำเป็นต้องกินเพิ่มเป็น 2 เท่าในครั้ง
ต่อไป ให้กินยาในขนาดปกติ

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ในกรณีผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคไต ที่กินยามาก
เกินไป หากมีอาการท้องอืด อาจทำให้เกิด
อันตราย ให้พบแพทย์ทันที
- ถ้ากินยานี้มากเกินไป อาจทำให้รู้สึกท้องอืด
ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการ
ผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ในกรณีที่กินยาร่วมกับยาอื่น เช่น เตตราไซคลิน
(tetracyclines), ฟลูออโรควิโนโลน
(fluoroquinolones), เกลือของธาตุเหล็ก (iron
salts), ไทรอยด์ฮอร์โมน (thyroid hormones),
คลอโรควิน(chloroquine), บิสฟอสโฟเนต
(bisphosphonates) และเอส ตรามีสทีน
(estramustine) ควรกินห่างกันอย่างน้อย 2
ชั่วโมง
- เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคกรดไหลย้อน
หลีกเลี่ยงการกินอาหารมัน หรืออาหารลดจัด
งดการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที
หากมีอาการแพ้ต่อส่วนประกอบในยา และเกิดอาการ
ต่อไปนี้

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
หรือเลือดออกผิดปกติ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ให้เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- ไม่ควรโดนแสงแดด
- ไม่เก็บยาในตู้เย็น
- ไม่เก็บยาในที่ชื้น

ผู้ผลิต

ผู้นำเข้า

ผู้แทนจำหน่าย (ถ้ามี)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

ผงน้ำตาลเกลือแร่ (Oral Rehydration Salt: ORS) [ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ผงน้ำตาลเกลือแร่
- เป็นยาในกลุ่ม ยาแก้ท้องเสีย

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ทดแทนการเสียน้ำและเกลือแร่ในผู้ที่มีอาการท้องเสีย หรืออาเจียนมาก

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีโรคหัวใจ
- มีโรคไต
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
- เทผงยาทั้งซองละลายในน้ำสะอาด 1 แก้ว (250 มิลลิลิตร)
- เด็กอายุมากกว่า 2 ปี และผู้ใหญ่ ดื่ม 1 แก้วต่อการถ่าย 1 ครั้ง
- เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ให้ดื่มทีละน้อย (10 มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่อการถ่าย 1 ครั้ง)
- หลังผสมน้ำแล้ว ควรดื่มภายใน 24 ชั่วโมง หากดื่มไม่หมดให้ทิ้งยา ไม่ควรเก็บไว้ข้ามคืน

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการอยู่ สามารถกินยาได้ทันที

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ถ้าผู้ป่วยมีอาการ ถ่ายเพิ่มมากขึ้น อาเจียนมาก มีไข้สูง เหงื่อออกมาก ตัวเย็น หรือหมดสติ ควรนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยด่วน

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ ออย.
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ ออย.

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจุดตามผิวหนัง
- ชักเกร็ง จากเกลือโซเดียมในเลือดสูง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ซึม อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร กระหายน้ำ จากเกลือโซเดียมในเลือดสูง
- ปวดหัว คลื่นไส้ จากเกลือโซเดียมในเลือดต่ำ

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง หรือในที่ชื้น เก็บในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นผงแห้ง บรรจุในซอง
- **ตัวยาสําคัญใน 1 ซอง :**
 - โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride) 0.650 กรัม
 - ไตรโซเดียมซิเตรตไดไฮเดรต (trisodium citrate dihydrate) 0.725 กรัม
 - โพแทสเซียมคลอไรด์ (potassium chloride) 0.375 กรัม
 - กลูโคส (glucose) 3.375 กรัม

**ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย
ความแรง 250-350 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด/แคปซูล
[ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]**

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ผงถ่านชาร์โคล (activated charcoal)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อรักษาอาการท้องเสีย

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะลำไส้ทะลุหรือลำไส้อุดตัน หรือลำไส้ทำงานผิดปกติ
- เพิ่งได้รับการผ่าตัดรักษาเมื่อเร็ว ๆ นี้
- มีความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร เช่น ต้มเหล้าเป็นประจำ ใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเสด เป็นต้น

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่

**ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- กินยานี้ห่างจากยาอื่น ๆ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- ขนาดทั่วไปที่แนะนำ กินครั้งละ 3-4 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากไม่มีอาการของโรคแล้ว สามารถหยุดยาได้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาดัดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ห้ามกินยานี้พร้อมกับยาอื่น เพราะยานี้อาจจะติดกันกับยาอื่น
- ถ้าอาการท้องเสียยังไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วัน หลังใช้ยานี้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](#)

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ [อย.](#)

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้นบวม
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- ปวดท้องร่วมกับคลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้าอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- อูจาระมีสีดำ
- อาเจียน
- สำลักเศษอาหาร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา]ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: เม็ดสีดำ หรือแคปซูลเปลือกแข็ง
- ตัวอย่างสำคัญ: ผงถ่านชาร์โคล 250-350 มิลลิกรัม
- ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 10 เม็ดหรือแคปซูล (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

ยาระบาย กลีเซอริน
ชนิดเหน็บทวาร
(Glycerin suppository)
[ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาระบายกลีเซอริน (glycerin suppository)
- เป็นยาในกลุ่ม ยาระบาย

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยาระบาย บรรเทาอาการท้องผูก

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะลำไส้อุดตัน

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีโรคเบาหวาน
- ตั้งท้อง โดยเฉพาะช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งท้อง
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ **อย.**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่ ใช้ขนาดใหญ่ (2.55 กรัม) เหน็บทวารหนักครั้งละ 1 แท่ง
- เด็ก ใช้ขนาดเล็ก (1.5 กรัม) เหน็บทวารหนักครั้งละ 1 แท่ง
- ถ้ามีอาการปวดท้อง อยากรถ่าย ให้อุจจาระ 15 นาที เพื่อให้ยาละลาย
- ห้ามกลืนยานี้เด็ดขาด
- วิธีใช้ยาเหน็บทวาร ศึกษาเพิ่มเติมจากท้ายเอกสาร

3.2 ถ้าใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลังใช้ยานี้ถ้าอาการท้องผูกไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์
- ถ้าหยุดใช้ยาแล้วกลับไปมีอาการท้องผูก หรือต้องใช้ยาระบายทุกวันเพื่อช่วยให้ขับถ่ายได้ควรไปพบแพทย์
- ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ปวดท้อง
- ระคายเคืองบริเวณทวารหนัก

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่านำให้โดนแสงโดยตรง หรือในที่ชื้น
- เก็บยาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา


- ยามีลักษณะ เป็นแท่งบรรจุในแผง
- **ตัวยาสําคัญ** คือ กลีเซอริน (glycerin)

วิธีใช้ยาเหน็บทวาร

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ถ้ายาเหน็บนิ่ม ให้แช่ยาในตู้เย็นหรือน้ำเย็นก่อนแกะยาออกจากห่อ เพื่อให้ยาแข็งตัวและสอดได้ง่ายขึ้น
3. แกะยาออกจากห่อ
4. นอนตะแคง โดยให้ขาข้างเหยียดตรง และงอขาข้างที่อยู่ด้านบนให้หัวเข่าอยู่ใกล้หน้าอก หรือ ยืนตรงยกขาข้างหนึ่งขึ้นเหยียบบนเก้าอี้หรือนั่งยอง ๆ แยกขาเล็กน้อยคลายเวลานั่งถ่าย
5. เอามืออ้อมขาไปด้านหลังแล้วสอดยาเหน็บเข้าไปในทวารหนัก โดยให้ด้านที่เรียกว่าเข้าไปก่อน ใช้นิ้วค่อย ๆ ดันยาเข้าทวารหนัก จนยาทั้งแท่งอยู่เหนือหูรูดทวารหนัก เพื่อไม่ให้แท่งยาหลุดออกมา
6. นอนในท่าเดิม ประมาณ 15 นาที
7. หากมีอาการอยากถ่ายอุจจาระ ให้อั้นไว้เพื่อให้ยาละลาย อย่างน้อย 15 นาที



แสดงท่านอนเพื่อสอดยาเหน็บทวารหนัก



แสดงวิธีการสอดยาเหน็บทวารหนักเข้าไปในทวารหนัก



แสดงวิธีการสอดยาเหน็บทวารหนักที่ถูกต้อง

ยาระบาย แมกนีเซียม ชนิดน้ำแขวนตะกอน (Milk of Magnesia) [ข้อควรคำ ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาระบายแมกนีเซียม (Milk of Magnesia)
- เป็นยาในกลุ่ม ยาระบาย

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยาระบาย บรรเทาอาการท้องผูก

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- มีโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ที่ยังไม่ได้รับการรักษา

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออกแพทย์หาก ท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีโรคไต
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- เขย่าขวดก่อนใช้ยา
- ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 2-3 ช้อนโต๊ะ (30-45 มิลลิลิตร) ก่อนนอน
- เด็ก 6-12 ปี กินครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ (15-30 มิลลิลิตร) ก่อนนอน
- เด็ก 1-6 ปี กินครั้งละ 1-3 ช้อนชา (5-15 มิลลิลิตร) ก่อนนอน
- ไม่แนะนำ ให้กินยาต่อเนื่องเกิน 3 วัน

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการอยู่ สามารถกินยาได้ในมือถัดไป
- ไม่แนะนำ ให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลังใช้ยานี้ ถ้าอาการท้องผูกไม่ดีขึ้น หรือมีอาการปวดท้องมากขึ้น ควรไปพบแพทย์
- ถ้าหยุดใช้ยาแล้วกลับไปมีอาการท้องผูก หรือต้องใช้ยาระบายทุกวันเพื่อช่วยให้ขับถ่ายได้ ควรไปพบแพทย์

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ท้องเสีย
- ปวดท้อง

6. ควรเก็บยาได้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง หรือในที่ชื้น ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็ง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ยามีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่เปิดใช้ครั้งแรก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ยามีลักษณะ** เป็นน้ำแขวนตะกอน บรรจุในขวด
- **ตัวยาสำคัญ** คือ แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (magnesium hydroxide)

ยาระบาย มะขามแขก
ชนิดเม็ด
(Senna Tablet)
[ข้อควรระวัง ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาระบาย มะขามแขก
- เป็นยาในกลุ่ม ยาระบาย

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้บรรเทาอาการท้องผูก ในเด็กอายุมากกว่า 6 ปี และผู้ใหญ่

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะลำไส้อุดตัน
- มีโรคลำไส้อักเสบ หรือกำลังเป็นไส้ติ่งอักเสบ
- มีโรคหัวใจล้มเหลว
- มีภาวะสูญเสียน้ำอย่างรุนแรง
- มีอาการปวดท้องหรือคลื่นไส้อาเจียน
- มีเลือดออก ปนมากับอุจจาระ
- ตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีโรคไต
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 3-4 เม็ด ก่อนนอน
- เด็ก 6-12 ปี กินครั้งละ 1-2 เม็ด ก่อนนอน

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการอยู่ สามารถกินยาได้ในมือถัดไป
- ไม่แนะนำให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล
พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลังกินยาถ้าอาการท้องผูกไม่ดีขึ้นใน 3 วัน หรือมี
อาการปวดท้องมากขึ้น ควรไปพบแพทย์
- ถ้าหยุดใช้ยาแล้วกลับไปมีอาการท้องผูก หรือต้อง
ใช้ยาระบายทุกวันเพื่อช่วยให้ขับถ่ายได้ ควรไปพบ
แพทย์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ท้องเสีย
- ปวดเกร็งท้อง
- คลื่นไส้ เวียนหัว
- ลำไส้ทำงานน้อยลง ท้องผูกเมื่อหยุดใช้ยา
- คอแห้ง หน้ามืด จากการสูญเสียน้ำ

6. การเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง หรือในที่ชื้น
- ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา]
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นเม็ด
- **ตัวยาสำคัญ** คือ มะขามแขก ที่มีปริมาณสารสำคัญ
เทียบเท่า เช่นโนซายด์ บี (Sennoside B) 7.5
มิลลิกรัม

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ยาระบาย โซเดียมคลอไรด์ ชนิดสวนทวาร (Sodium Chloride Enema) [ข้อควรค่า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่ออะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาระบายโซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride enema)
- เป็นยาในกลุ่ม ยาระบาย

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้สวนทวารให้ถ่ายอุจจาระ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- มีโรคลำไส้กลืนกัน
- มีโรคลำไส้อุดตัน หรือลำไส้ไม่เคลื่อนไหว
- มีโรคลำไส้อักเสบ
- มีเลือดออกทางทวารหนัก
- มีโรคไส้ติ่งอักเสบ
- มีโรคหัวใจ
- มีอาการปวดท้อง

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีโรคความดันโลหิตสูง ที่ไม่สามารถคุมความดันได้
- มีภาวะท้องโต มีน้ำในช่องท้อง
- มีแผลที่ทวารหนัก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้สวนทวารเท่านั้น
 - ผู้ใหญ่ ใช้ครั้งละ 20-30 มิลลิลิตร
 - เด็ก 6-12 ปี ใช้ครั้งละ 10-20 มิลลิลิตร
 - เด็ก 1-6 ปี ใช้ครั้งละ 5-10 มิลลิลิตร
 - ถ้ามีอาการปวดท้องอยากถ่าย ให้ออนในท่าเดิม ประมาณ 15 นาที หรือจนกว่าจะทนไม่ไหว เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้เต็มที่
 - วิธีการใช้ยาสวนทวารศึกษาเพิ่มเติมจากท้ายเอกสาร
- ### 3.2 ถ้าใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลังใช้ยานี้ถ้าอาการท้องผูกไม่ดีขึ้นภายใน 7 วัน ควรไปพบแพทย์
- ไม่ควรใช้ยานี้ต่อเนื่อง เป็นเวลานาน
- ถ้าหยุดใช้ยาแล้วกลับไปมีอาการท้องผูก หรือต้องใช้ยาระบายทุกวันเพื่อช่วยให้ขับถ่ายได้ ควรไปพบแพทย์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- มีเลือดออกทางทวารหนัก

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- คอแห้ง กระหายน้ำ จากการสูญเสียน้ำ
- ท้องเสีย
- ปวดท้อง
- รู้สึกคัน หรือระคายเคือง บริเวณทวารหนัก

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง หรือในที่ชื้น
- ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา]
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นน้ำใส บรรจุในหลอดพลาสติก
- **ตัวยาสำคัญ** คือ โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride 15% w/v)

วิธีใช้ยาสวนทวารหนัก

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ถ้ามีฝาปิดหลอดสวน ให้เอาฝาปิดออกก่อน และปล่อยให้หลอดสวนคลายหลอด สารด้วยสารหล่อลื่น
3. นอนตะแคงโดยใช้ขาข้างเหยียดตรง และงอขาข้างที่อยู่ด้านบนหัวเข่าอยู่ใกล้หน้าอก
4. สอดปลายหลอดสวนเข้าไปในทวารหนัก สอดโดยค่อยๆ หมุนขวดยาเข้าไปอย่างช้าๆ
5. ค่อยๆ บีบยาจากขวดหรือภาชนะบรรจุน้ำยาอย่างช้าๆ จนน้ำยาหมด
6. ขมิบทวารหนักไว้ 2-3 วินาที
7. นอนในท่าเดิมประมาณ 15-30 นาที หรือจนกว่าจะทนไม่ได้ จึงลุกไปถ่ายอุจจาระ เนื่องจากหากถ่ายอุจจาระทันทีที่รู้สึกอยากถ่าย อาจทำให้ยาออกมาจากทวารหนักก่อนที่จะออกฤทธิ์ได้เต็มที่

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ยาถ่ายพยาธิตัวกลม
มีเบนดาโซล
ความแรง 100 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคี้ยว
[ข้อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า มีเบนดาโซล (mebendazole)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อถ่ายพยาธิเส้นด้าย พยาธิตัวกลม, พยาธิไส้เดือน, พยาธิแส้ม้า, พยาธิปากขอ, พยาธิเข็มหมุด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
- หญิงมีท้อง หรือสงสัยว่าจะตั้งท้อง

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- อยู่ระหว่างให้นมลูก
- เป็นโรคตับ หรือตับทำงานผิดปกติ

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน
- สำหรับพยาธิเส้นด้ายและพยาธิเข็มหมุด: กินครั้งละ 1 เม็ด เพียงครั้งเดียว
- สำหรับพยาธิตัวกลมอื่น ๆ เช่น พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือนและพยาธิแส้ม้า: กินครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เข้า-เย็น ติดต่อกัน 3 วัน
- กินยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำเลือดตามผิวหนัง
- มีไข้สูง อาการชัก ตัวแข็งเกร็ง กล้ามเนื้อกระตุกหมดสติ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม เบื่ออาหาร
- เป็นไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามตัว

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ ยกเว้นกรณีมีอาการรุนแรง

- ไม่สบายท้อง ปวดท้อง ท้องอืด
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: เม็ด
- ตัวยาสาคัญ: มีเบนดาโซล 100 มิลลิกรัม
- ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 6 เม็ด (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

พาราเซตามอล ขนาด 500 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด [ชื่อการค้า]

คำเตือน

“ระบุคำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน”

1. ยานี้คืออะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่าพาราเซตามอล (paracetamol) เป็นยาในกลุ่มลดไข้ บรรเทาปวด
- ยานี้ใช้เพื่อลดไข้ บรรเทาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยจากไข้หวัด ปวดฟัน ปวดประจำเดือน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดจากข้อเสื่อม

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- ☒ ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาพาราเซตามอลหรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
- ☒ ห้ามใช้พาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากและเอกสารกำกับยา เพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนตับวายและเสียชีวิตได้

☒ **หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอล** เป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้หากมีภาวะพร่องจีซิกซ์พีดี (G6PD) หรือกำลังกินยาด้านการแข็งตัวของเลือดวอร์ฟาริน เพราะอาจเกิดอันตรายจากยานี้ได้ง่ายขึ้น

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต เพราะอาจเกิดอันตรายจากยานี้ได้ง่ายขึ้น
- ถ้ามีไข้สูง (อุณหภูมิสูงกว่า 39.5 องศาเซลเซียส) ให้รีบไปพบแพทย์

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ขนาดยา
น้อยกว่า 34	ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ตั้งแต่ 34 ถึง 50	กินยาครั้งละ 1 เม็ด แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
มากกว่า 50 ถึง 67	กินยาครั้งละ หนึ่งเม็ดครึ่ง วันละไม่เกิน 5 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
มากกว่า 67	กินยาครั้งละ 2 เม็ด วันละไม่เกิน 4 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร
รีบไปพบแพทย์ทันที เพราะหากได้รับยาเกินขนาดไปมากและได้รับการรักษาไม่ทันท่วงทีจะทำให้ตับถูกทำลาย นำไปสู่การเสียชีวิตจากตับวายได้

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ไม่กินยาดูดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดภายใน 3 วัน หรืออาการปวดไม่บรรเทาภายใน 5 วัน ให้ไปพบแพทย์เนื่องจากอาจเป็นอาการของโรคที่ร้ายแรงได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- มีจ้ำตามผิวหนัง เลือดออกผิดปกติ เหนื่อยง่าย เป็นหวัดได้ง่าย

ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

5.2 หากจำเป็นต้องกินยานี้ต่อเนื่องแล้วเกิดอาการ เช่น

- อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ตัวเหลือง ตาเหลือง บัสสาวะสีเข้มขึ้น

ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แยกยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ ... <ปรับตามทะเบียนยา> ... องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ระบุลักษณะและสีของยา และระบุส่วนประกอบในตำรับ ... <ปรับตามทะเบียนยา> ...

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ.....

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

พาราเซตามอล ขนาด 325 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด [ข้อควรระวัง]

คำเตือน

“ระบุคำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน”

1. ยานี้คือยาอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่าพาราเซตามอล (paracetamol) เป็นยาในกลุ่มลดไข้ บรรเทาปวด
- ยานี้ใช้เพื่อลดไข้ บรรเทาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยจากไข้หวัด ปวดฟัน ปวดประจำเดือน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดจากข้อเสื่อม

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาพาราเซตามอลหรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
- ห้ามใช้พาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากและเอกสารกำกับยา เพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนตับวายและเสียชีวิตได้
- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้หากมีภาวะพร่องกลูโคส (G6PD) หรือกำลังกินยาด้านการแข็งตัวของเลือดวอร์ฟาริน เพราะอาจเกิดอันตรายจากยานี้ได้ง่ายขึ้น

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต เพราะอาจเกิดอันตรายจากยานี้ได้ง่ายขึ้น
- ถ้ามีไข้สูง (อุณหภูมิสูงกว่า 39.5 องศาเซลเซียส) ให้รีบไปพบแพทย์

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ขนาดยา
ตั้งแต่ 22 ถึง 33	กินยาครั้งละ 1 เม็ด แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
มากกว่า 33 ถึง 44	กินยาครั้งละ หนึ่งเม็ดครึ่ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
มากกว่า 44	กินยาครั้งละ 2 เม็ด แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร
รีบไปพบแพทย์ทันที เพราะหากได้รับยาเกินขนาดไปมาก และได้รับการรักษาไม่ทันท่วงทีจะทำให้ตับถูกทำลายนำไปสู่การเสียชีวิตจากตับวายได้

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ไม่กินยาดูดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดภายใน 3 วัน หรืออาการปวดไม่บรรเทาภายใน 5 วัน ให้ไปพบแพทย์เนื่องจากอาจเป็นอาการของโรคที่ร้ายแรงได้

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ ออย.
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ ออย.

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- มีจ้ำตามผิวหนัง เลือดออกผิดปกติ เหนื่อยง่าย เป็นหวัดได้ง่าย

ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

5.2 หากจำเป็นต้องกินยานี้ต่อเนื่องแล้วเกิดอาการ เช่น

- อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มขึ้น

ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แยกยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิ ... <ปรับตามทะเบียนยา> ... องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ระบุลักษณะและสีของยา และระบุส่วนประกอบในตำรับ
... <ปรับตามทะเบียนยา> ...

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ.....

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

พาราเซตามอล
120 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร
**ชนิดน้ำเชื่อมเข้มข้น/
ชนิดน้ำแขวนตะกอนเข้มข้น**
[ข้อการค้า]

คำเตือน

“ระบุคำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน”

1. ยานี้คือยาอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่าพาราเซตามอล (paracetamol) เป็นยาในกลุ่มลดไข้ บรรเทาปวด
- ยานี้ใช้เพื่อลดไข้ บรรเทาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยจากไข้หวัด ปวดฟัน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาพาราเซตามอลหรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
- ห้ามใช้พาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากและเอกสารกำกับยาเพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนตับวาย เสียชีวิตได้
- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้หากมีภาวะพร่องจีชีกซ์พีดี (G6PD) หรือกำลังกินยาด้านการแข็งตัวของเลือด วอร์ฟาริน หรือเป็นโรคตับหรือโรคไต เพราะอาจเกิดอันตรายจากยานี้ได้ง่ายขึ้น

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ ออย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ ออย.

- ถ้ามีไข้สูง (อุณหภูมิสูงกว่า 39.5 องศาเซลเซียส) ให้รีบไปพบแพทย์
- การใช้ยาในเด็กอายุต่ำกว่า 2 เดือน ให้ปรึกษาแพทย์

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

อายุ	ขนาดยา	
น้อยกว่า 2 เดือน	ให้ปรึกษาแพทย์	
2 ถึง 3 เดือน ที่มีน้ำหนัก 4 – 6 กิโลกรัม	กินครั้งละ ครึ่งช้อนชา (หรือ 2.5 มิลลิลิตร) วันละ 1 ครั้ง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้ หากจำเป็นต้องกินอีกครั้ง ห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ถ้าไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร	
มากกว่า 3 เดือน	กินยาเฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้ วันละไม่เกิน 5 ครั้ง แต่ละครึ่งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ตามขนาดยาในตาราง	
น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ช้อนชาตวงยา	กระบอกฉีดยา*
ตั้งแต่ 4 - 6	ครึ่งช้อน	2.5 มิลลิลิตร
มากกว่า 6 - 8	สามส่วนสี่ช้อน	3.75 มิลลิลิตร
มากกว่า 8 - 12	หนึ่งช้อน	5 มิลลิลิตร
มากกว่า 12 - 16	หนึ่งช้อนครึ่ง	7.5 มิลลิลิตร
มากกว่า 16 - 24	สองช้อน	10 มิลลิลิตร
* หรือถ้วยตวงยา		

วิธีใช้ยา

- เขย่าขวดก่อนใช้ยา
- ตวงยาและป้อนยา ด้วยกระบอกฉีดยา (ไซริงค์) หรือ ช้อนชา ตวงยา หรือ ถ้วยตวงยา

3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

รีบไปพบแพทย์ทันที เพราะหากได้รับยาเกินขนาดไปมากแล้ว ได้รับการรักษาไม่ทันท่วงทีจะทำให้ตับถูกทำลาย นำไปสู่การเสียชีวิตจากตับวายได้

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการไข้

- ไม่กินยาดัดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดภายใน 3 วัน หรืออาการปวดไม่บรรเทาภายใน 5 วัน ให้ไปพบแพทย์เนื่องจากอาจเป็นอาการของโรคที่ร้ายแรงได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- มีจ้ำตามผิวหนัง เลือดออกผิดปกติ เหนื่อยง่าย เป็นหวัดได้ง่าย

ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

5.2 หากจำเป็นต้องกินยานี้ต่อเนื่องแล้วเกิดอาการ เช่น

- อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มขึ้น

ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ ... <ปรับตามทะเบียนยา>... องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ระบุลักษณะและสีของยา และระบุส่วนประกอบในตำรับ ... <ปรับตามทะเบียนยา>...

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ.....

พลาสเตอร์บรรเทาปวด ชนิดแผ่นแปะ [ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาสูตรผสม มีชื่อว่า พลาสเตอร์บรรเทาปวด ซึ่งมีตัวยาสำคัญและส่วนประกอบตามที่ระบุในข้อ 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีประวัติแพ้ยาแอสไพริน
- เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- แปะพลาสเตอร์บริเวณที่มีอาการปวด
- ล้างทำความสะอาดผิวหนังก่อนที่จะแปะพลาสเตอร์
- ควรเปลี่ยนพลาสเตอร์วันละ 1-2 ครั้ง
- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด
- หลีกเลี่ยงการแปะพลาสเตอร์ใกล้เคียงผิวหนังบริเวณที่บอบบาง เช่น ริมฝีปาก หรือดวงตา หรือผิวหนังบริเวณที่มีบาดแผล

3.2 ถ้าใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากใช้ยานี้แล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- ล้างมือทุกครั้งหลังจากแปะพลาสเตอร์

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- แสบ ร้อน บริเวณที่แปะพลาสเตอร์

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ยามีลักษณะ** เป็นพลาสเตอร์สำหรับแปะผิวหนัง
- **ตัวยาสำคัญ** คือ พิมเสน (borneol) การบูร (camphor) ยางอินเดีย (caoutchouc) เอทิลีนไกลคอลซาลิไซเลต (ethylene glycol salicylate) น้ำมันยูคาลิปตัส (eucalyptus oil) เมนทอล (menthol) เมทิลซาลิไซเลต (methyl salicylate) น้ำมันสะระแหน่ (peppermint oil) ไทมอล (thymol) สารสกัดพริก (capsaicin extract) โพลีบิวทีน (polybutene) ผงพริก (capsicum powder) สารสกัดพริกแดง (capsicum oleoresin) ซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide) <ปรับข้อมูลตามทะเบียนยา>

- **ขนาดบรรจุ** ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 10 แผ่น (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน้ำมูก คลอร์เฟนิรามีน
ความแรง 2 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า คลอร์เฟนิรามีน (chlorpheniramine)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการต่าง ๆ จากการแพ้ เช่น น้ำมูกไหล ตาแดง คัดน้ำ คัดจมูก ในโรคเยื่อจมูกอักเสบหรือไข้ละอองฟาง หรือ เพื่อบรรเทาอาการแพ้บริเวณผิวหนัง เช่น ลมพิษ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- ใช้ยาต้านซึมเศร้าประเภท " ยับยั้ง โมโนเอมีนออกซิเดส" ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- เป็นโรคความดันเลือดสูง หรือ โรคหัวใจ
- ไต หรือ ตับ ทำงานผิดปกติ
- ผู้ป่วยโรคลมชัก
- ผู้ป่วยโรคหอบหืด
- ต่อมลูกหมากโต มีภาวะปัสสาวะขัด
- หญิงตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- เป็นต่อหิน ความดันในลูกตาสูง

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1-2 เม็ด ไม่เกิน 12 เม็ด/วัน
- เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 1 เม็ด ไม่เกิน 6 เม็ด/วัน
- กินทุก 4-6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากไม่มีอาการของโรคแล้วสามารถหยุดยาได้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน
- ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร
- ไม่ควรกินร่วมกับสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
- ไม่ควรใช้ยานี้มากกว่า 1 สัปดาห์ หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจำกัดตามผิวหนัง
- มีไข้ ตัวเหลือง ตาเหลือง ดีซ่าน ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติที่ตับ
- ปัสสาวะขัด ปัสสาวะออกน้อยลง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้าอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปากแห้ง คอแห้ง จมูกแห้ง
- ง่วงซึม เหนื่อย เพลีย ไม่มีแรง
- คลื่นไส้ ท้องเสีย ไม่สบายท้อง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาเม็ด
- ตัวยาสาคัญ: คลอร์เฟนิรามีน 2 มิลลิกรัม
- ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 10 เม็ด (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

ยาแก้ไอขับเสมหะ สำหรับเด็ก ชนิดน้ำ

ประกอบด้วย
แอมโมเนียมคาร์บอเนต
20 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร
สารสกัดชะเอมเทศ
0.25 มิลลิลิตรต่อ 5 มิลลิลิตร
[ข้อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาแก้ไอขับเสมหะ สำหรับเด็ก
- เป็นยาในกลุ่ม ยาแก้ไอขับเสมหะ

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ในเด็กอายุ 1-12 ปี

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออกแพทย์ หากท่านมีอาการต่อไปนี้

- มีอาการไอเรื้อรัง
- เป็นโรคหอบหืด
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- เด็ก 1-3 ปี กินครั้งละ ครึ่งช้อนชา (2.5 มิลลิลิตร)
- เด็ก 3-6 ปี กินครั้งละ 1 ช้อนชา (5 มิลลิลิตร)
- เด็ก 6-12 ปี กินครั้งละ 2 ช้อนชา (10 มิลลิลิตร)
- กินยานี้วันละ 3-4 ครั้ง เมื่อมีอาการไอ

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการอยู่ สามารถกินยาได้ในมื้อถัดไป
- ไม่แนะนำให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล
พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลังกินยาถ้าอาการไอไม่ดีขึ้นภายใน 5 วัน
ควรไปพบแพทย์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีฝ้าตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

- แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์
- ปวดท้อง
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควร
เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตาม
ทะเบียนยา] หรือในที่ชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ หรือ
ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ยามีลักษณะ** เป็นน้ำ ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 120
มิลลิลิตร (ตามที่สูงทะเบียน)
- **ตัวยาสําคัญ** คือ แอมโมเนียมคาร์บอเนต (ammonium
carbonate) 20 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร และสารสกัด
ชะเอมเทศ (glycyrrhiza fluid extract) 0.25 มิลลิลิตร
ต่อ 5 มิลลิลิตร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

ยาแก้ไอน้ำดำ ชนิดน้ำ

ประกอบด้วย

สารสกัดชะเอมเทศ

0.6 มิลลิลิตร ต่อ 5 มิลลิลิตร

แอนติโมนีโพแทสเซียมทาร์เตรด

1.2 ถึง 2 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร

ทิงเจอร์ฝิ่นการบูร

0.6 มิลลิลิตร ต่อ 5 มิลลิลิตร

[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาแก้ไอน้ำดำ
- เป็นยาในกลุ่ม ยาแก้ไอขับเสมหะ

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- ผู้ที่มีอาการท้องร่วงเนื่องจากอาหารเป็นพิษ
- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์

หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีประวัติแพ้ยากลุ่มโอปิออยด์
- ดับหรือไตทำงานบกพร่อง
- มีการทำงานของต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต หรือต่อมอดิพิต
- มีโรคหืด ต่อมลูกหมากโต ลมชัก อ้วน หรือโรคหัวใจ
- เคยได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ศีรษะ
- มีประวัติติดสารเสพติด
- วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- เด็ก 6-12 ปี กินครั้งละ ครั้ง ถึง 1 ช้อนชา (2.5-5 มิลลิลิตร)
- ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มิลลิลิตร)
- กินยานี้วันละ 3-4 ครั้ง เมื่อมีอาการไอ

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการอยู่ สามารถกินยาได้ในมือถัดไป
- ไม่แนะนำให้ ให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามกินยานี้ติดต่อกันเกิน 3 วัน เนื่องจากทำให้เกิดอาการดื้อยา และติดยาได้
- ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
- หลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หลังจากใช้ยานี้ เนื่องจากยานี้ทำให้ง่วงซึมได้

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจุดตามผิวหนัง
- ชัก
- การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป เห็นภาพไม่ชัด
- มึนงง สับสน อารมณ์แปรปรวน เห็นภาพหลอน
- ปวดท้องหรือปวดหลังอย่างรุนแรง ซึ่งอาจเป็นอาการของโรคเกี่ยวกับต่อมอดิพิต

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว เวียนหัว
- ง่วงซึม
- นอนไม่หลับ
- ปากแห้ง คอแห้ง
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก เบื่ออาหาร
- บัสสาวะออกน้อย หรือบัสสาวะลำบาก

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] หรือในที่ชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ หรือห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ยามีลักษณะ** เป็นน้ำ ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 60 มิลลิลิตร (ตามที่ขึ้นทะเบียน)
- **ตัวยาสาคัญ** คือ
 - สารสกัดชะเอมเทศ (glycyrrhiza fluidextract) 0.6 มิลลิลิตร ต่อ 5 มิลลิลิตร
 - แอนติโมนีโพแทสเซียมทาร์เตรด (antimony potassium tartrate) 1.2 ถึง 2 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร
 - ทิงเจอร์ฝิ่นการบูร (camphorated opium tincture) 0.6 มิลลิลิตร ต่อ 5 มิลลิลิตร

ยาดมแก้งเวียน
เหล่าแอมโมเนียหอม
ชนิดสารละลาย
[ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

ยาใช้ภายนอก/ยาใช้เฉพาะที่
ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาสูตรผสม มีชื่อว่า เหล้าแอมโมเนียหอม มีตัวยาคือ แอมโมเนียมคาร์บอเนต (ammonium carbonate) และสารละลายแอมโมเนีย (ammonia solution)

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ดมเพื่อบรรเทาอาการเวียน หน้ามืด
- ใช้ทาผิวหนัง เพื่อบรรเทาอาการจากพิษแมลงกัด ต่อย หรือถูกพิษมีพิษ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้ขุบสำลีแล้วดม เพื่อบรรเทาอาการเวียน หน้ามืด
- ใช้ทาลงบนผิวหนังบริเวณที่มีอาการ เพื่อบรรเทาอาการจากพิษแมลงหรือพิษ
- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด

3.2 ถ้าใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- รู้สึกแสบหรือระคายเคืองทางเดินหายใจ
- รู้สึกแสบหรือระคายเคืองบริเวณที่ทายา
- ไอ

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

6. การเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นสารละลาย
- **ตัวยาสาคัญ** คือ แอมโมเนียมคาร์บอเนต (ammonium carbonate) และสารละลายแอมโมเนีย (ammonia solution)
- **ขนาดบรรจุ** ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 15 มิลลิลิตร (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

ยาดมแก้วิงเวียน แก้กัดจุมุก [ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

ยาใช้ภายนอก/ยาใช้เฉพาะที่
ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาสูตรผสม ชื่อว่า ยาดมแก้วิงเวียน แก้กัดจุมุก ซึ่งมีตัวยาสำคัญและส่วนประกอบตามที่ระบุในข้อ 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการคัดจุมุก หายใจไม่ออก และบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 3 เดือน

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้สูดดม เมื่อมีอาการ
- ทายาบางๆ บริเวณคอหรือหน้าอก เพื่อให้ยาระเหยเข้าสู่จุมุก
- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด

3.2 ถ้าใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจ้ำตามผิวหนัง

“ให้รีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ระคายเคืองบริเวณที่ทายา

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ยามีลักษณะ** เป็นยาสูดดมหรือยาน้ำสำหรับสูดดม
- **ตัวยาสำคัญ** คือ เมนทอล (menthol) การบูร (camphor, camphor spirit, borneo camphor) เมทิลซาลิไซเลต (methyl salicylate) น้ำมันเทียนสัตตบงกช (anise oil) น้ำมันมะกรูด (burgamot oil) น้ำมันคาจูปูท (cajuput oil) น้ำมันอบเชย (cassia oil) น้ำมันกานพลู (clove oil) น้ำมันสนเข็ม (dwarf – pine needle oil) น้ำมันยูคาลิปตัส (eucalyptus oil) น้ำมันลาเวนเดอร์ (lavender oil) น้ำมันสะระแหน่ (peppermint oil) น้ำมันเสจ (sage oil) น้ำมันชาสเซอแฟรส (sassafras oil) น้ำมันสน (turpentine oil) ทิงเจอร์พริก (capsicum tincture) ทิงเจอร์มดยอบ (myrrh tincture) ทิงเจอร์ราแทนเจีย (ratanghis tincture) เทอร์พินอล (terpinol) ไทมอล (thymol) บอร์นิลอะซิเตต (bornyl acetate) ลินาลิลอะซิเตต (linalyl acetate) ฟีนิลซาลิไซเลต (phenyl salicylate) สารสกัดคาโมมายล์ (standard chamomile extract) <ปรับปรุงข้อมูลตามทะเบียนยา>

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

ยาทาระเหย
บรรเทาอาการคัดจมูก
ชนิดซีผึ้ง
[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาสูตรผสม มีชื่อว่า ยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูก ชนิดซีผึ้ง ซึ่งมีตัวยาสำคัญและส่วนประกอบตามที่ระบุในข้อ 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการคัดจมูก และลดอาการจากหวัด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีโรคหอบหืด
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ทายาบริเวณลำคอ หน้าอก และหลัง วันละ 2-4 ครั้ง
- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด
- หลีกเลี่ยงการทายาใกล้เคียงผิวหนังบริเวณที่บอบบาง เช่น ใบหน้า ริมฝีปาก หรือดวงตา หรือผิวหนังบริเวณที่มีบาดแผล

3.2 ถ้าใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้อาจทำให้มีอาการ อาเจียน ท้องเสีย ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ห้ามนำบริเวณที่ทายาเข้าใกล้เปลวไฟ เนื่องจากยาอาจติดไฟได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจ้ำตามผิวหนัง
- “ให้รีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ผื่น แดง คัน หรือแสบร้อน บริเวณที่ทายา

6. ควรเก็บยาได้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ยามีลักษณะ** เป็นยาซีผึ้ง
- **ตัวยาสำคัญ** คือ เมนทอล (menthol), การบูร (camphor) น้ำมันคาเจพูท (cajuput oil) น้ำมันยูคาลิปตัส (eucalyptus oil) น้ำมันสน (turpentine oil) <ปรับปรุงข้อมูลตามทะเบียนยา>
- **ขนาดบรรจุ** ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 50 กรัม (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ **อย.**

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ยาเม็ดแก้เมารถ เมารถเรือ
โดเมนไฮดริเนท
ความแรง 50 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด

[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า โดเมนไฮดริเนท (dimenhydrinate)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อป้องกันอาการเมารถ เมารถเรือ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออก แพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- เป็นโรคความดันเลือดสูง หรือ โรคหัวใจ
- ไต หรือ ตับ ทำงานผิดปกติ
- ผู้ป่วยโรคหอบหืด
- ต่อมลูกหมากโต มีภาวะปัสสาวะขัด
- หญิงตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- เป็นต่อหิน ความดันในลูกตาสูง

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยานี้อย่างไร

- ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1 เม็ด
- กินก่อนออกเดินทาง 30 นาที

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากไม่มีอาการของโรคแล้วสามารถหยุดยาได้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน
- ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร
- ไม่ควรกินร่วมกับสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](#)

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ [อย.](#)

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- ปัสสาวะขัด ปัสสาวะออกน้อยลง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้าอาการ รุนแรงให้ไปพบแพทย์ ทันที

- ปากแห้ง คอแห้ง จมูกแห้ง
- ง่วงซึม สับสน วิงเวียน
- ตาพร่ามัว

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียน] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาเม็ด
- ตัวยาสำคัญ: โดเมนไฮดริเนท 50 มิลลิกรัม
- ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 2 เม็ด (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

ยาล้างตา ชนิดน้ำยาไอโซโทนิก [ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

เป็นยาใช้เฉพาะที่ ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่ออะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาล้างตา ประกอบด้วย โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride) และวัตถุกันเสียที่เหมาะสม เช่น เบนซาลโคนียมคลอไรด์ (benzalkonium chloride) หรือ คลอร์เฮกซิดีน (chlorhexidine) [ปรับตามทะเบียนยา]

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ล้างตาเพื่อบรรเทาอาการแสบตา ระคายเคืองตา เนื่องจากสิ่งสกปรก ผงหรือควันเข้าตา

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- ใช้ล้างตาวันละ 2-3 ครั้ง
- วิธีการใช้ยา
 - เทน้ำยาลงในถ้วยล้างตาประมาณสามในสี่ของปริมาตรถ้วย
 - ก้มหน้าลงและยกถ้วยล้างตาขึ้นให้ปากถ้วยล้างตาแนบสนิทกับรอบดวงตา
 - เงยหน้าขึ้นและลืมตา กรอกตาไปมาในน้ำยา

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- ล้างถ้วยล้างตาด้วยน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนนำมาใช้ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณขอบและด้านในถ้วยล้างตา เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่ถ้วยล้างตา
- หากใส่คอนแทคเลนส์ ควรถอดก่อนใช้ยาล้างตา
- ห้ามนำน้ำยาที่ใช้ล้างตาแล้วกลับมาใช้ซ้ำอีก เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้มีอายุ 1 เดือนหลังจากเปิดใช้ครั้งแรก
- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาน้ำใสไม่มีสี
- ตัวยาสาคัญ:
 - โซเดียมคลอไรด์
 - เบนซาลโคนเนียมคลอไรด์ หรือ คลอร์เฮกซิดีน
- ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 240 มิลลิลิตร (ตามที่ขึ้นทะเบียน) พร้อมถ้วยล้างตา

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

ยากวาดคอ
ชนิดน้ำ
[ข้อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

เป็นยาใช้เฉพาะที่ ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยากวาดคอ ประกอบด้วยตัวยา โปแทสเซียมไอโอไดด์ (potassium iodide) ไอโอดีน (iodine) เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) น้ำมันสะระแหน (peppermint oil) และ กลีเซอริน (glycerin)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการอักเสบ และเจ็บในลำคอ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- ไตทำงานบกพร่องรุนแรง เช่น โรคไตวาย
- เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- หญิงตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผสมน้ำสะอาดเท่ากับปริมาตรยาก่อนใช้
- ใช้กวาดในลำคอ

3.2 ถ้าหายานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการ ผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นใช้ แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการ เดียวกัน
- ควรใช้ยาด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปากเป็นจำนวนมากเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลาสั้น หากอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

[ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.](#)
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้าอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ลิ้นรับรสผิดปกติ ได้รสโลหะในปาก
- รู้สึกแสบร้อนในปาก น้ำลายไหลเยอะผิดปกติ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่ให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาน้ำสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ
- ตัวยาสาคัญ:
 - โปแทสเซียมไอโอไดด์ 2.5 กรัม
 - ไอโอดีน 1.25 กรัม
 - เอทิลแอลกอฮอล์ 4 มิลลิลิตร
 - น้ำมันสะระแหน 0.4 มิลลิลิตร
 - กลีเซอริน ปรับปริมาตร 100 มิลลิลิตร
- ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 15 มิลลิลิตร (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

ยาเอนเซียนไวโอเลต
ชนิดน้ำ
[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียน]

เป็นยาใช้เฉพาะที่ ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า เอนเซียนไวโอเลต (gentian violet)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ทาแผลภายนอกที่เกิดจากเชื้อรา หรือใช้รักษาการติดเชื้อราที่ลิ้นและกระพุ้งแก้มในระยะสั้น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- หญิงตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้สำลีชุบน้ำยาทาบริเวณที่มีอาการ วันละ 2-3 ครั้ง

3.2 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

- แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที
- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติรุนแรงใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ ให้รีบไปพบแพทย์

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาน้ำสีม่วง
- ตัวยาสำคัญ: เอนเซียนไวโอเลต 1% w/v
- ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 30 มิลลิลิตร (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

[ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.](#)
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

ยาแก้ปวดฟัน
ชนิดน้ำ
[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

เป็นยาใช้เฉพาะที่ ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า คลอโรบิวทานอล (chlorobutanol) และ น้ำมันกานพลู (clove oil)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดฟันเนื่องจากฟันผุ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้ไม่เล็ก ๆ ฟันสาลีชุบน้ำยาอุดฟันตรงที่เป็นรู

3.2 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปาก หรือถูกบริเวณอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- หากใช้ยานี้แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาทันตแพทย์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ ยกเว้นกรณีมีอาการรุนแรง

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติรุนแรงใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ ให้รีบไปพบแพทย์

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาน้ำใสมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาล
- ตัวยาสาคัญ:
 - คลอโรบิวทานอล
 - น้ำมันกานพลู
- ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 8 มิลลิลิตร (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ยาอม
บรรเทาอาการระคายคอ
ชนิดเม็ด
[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาอมบรรเทาอาการระคายคอ ประกอบด้วยตัวยา เช่น สารหอมระเหย (volatile substance) สารสกัดจากสมุนไพร (herbal substance)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการระคายคอ ทำให้ชุ่มคอ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- อมครั้งละ 1-5 เม็ด ให้ละลายช้า ๆ ในปาก

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- หากใช้ยาแล้วอาการเจ็บคอไม่ดีขึ้นใน 7 วัน ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวนิ่งหลุดลอก มีจ้ำตามผิวนิ่ง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์

แต่ถ้าอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติรุนแรงใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาเม็ด
- ตัวยาสาคัญ เช่น :
 - เมนทอล 0.06-5 %w/w
 - น้ำมันยูคาลิปตัส 0.15-0.15 %w/w
 - น้ำมันสะระแหน่ 0.19-3.33 %w/w
 - น้ำมันกานพลู 0.67-4 %w/w
- ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 100 เม็ด หรือไม่เกิน 30 กรัม (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

ยาอม
บรรเทาอาการเจ็บคอ
ชนิดเม็ด
[ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ประกอบด้วยตัวยา เอมีลเมทาครีซอล (amyl metacresol) และ 2,4-ไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์ (2,4 dichloro benzyl alcohol) และอาจมีวิตามินซี (ascorbic acid) [ปรับตามทะเบียนยา]

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- หญิงตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
 - อมครั้งละ 1 เม็ด ให้ละลายช้า ๆ ในปาก ทุก 2-3 ชั่วโมง
 - ไม่ควรใช้ยาอมนี้เกิน 12 เม็ด ต่อวัน

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- หากอาการเจ็บคอไม่ดีขึ้นหลังใช้ติดต่อกัน 2 วัน ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ แต่ถ้าอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติรุนแรงใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ ให้รีบไปพบแพทย์

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาเม็ด
- ตัวยาสำคัญ:
 - เอมีลเมทาครีซอล ไม่เกิน 0.6 มิลลิกรัม
 - 2,4-ไดคลอโรเบนซิลแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 1.2 มิลลิกรัม
 - วิตามินซี ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม
- ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 8 เม็ด (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](#)
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ [อย.](#)

ยาใส่แผล
ทิงเจอร์ไอโอดีน
ชนิดน้ำ
[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาใส่แผลทิงเจอร์ไอโอดีน ประกอบด้วย ไอโอดีน (iodine) และ โพแทสเซียมไอโอไดด์ (potassium iodide)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาแผลสด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- กำลังใช้ยา "ลิเทียม" ในการรักษาอาการคลุ้มคลั่ง
- ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ
- เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- แผลเปิดขนาดใหญ่
- หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมลูก ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ตลอดช่วงการตั้งครรภ์ เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย

3. วิธีใช้ยา

3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาบริเวณที่เป็นแผล
- ไม่ควรใช้ผ้าพันหรือปิดแผลหลังทายา

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปากหรือดวงตา เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายจากการใช้ยา
- หากใช้ยานี้แล้วแผลแฉ่งหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- ระคายเคืองที่ผิวหนังรุนแรง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: สารละลายสีน้ำตาลเข้ม
- ตัวยาสาคัญ:
 - ไอโอดีน
 - โพแทสเซียมไอโอไดด์
- ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 30 มิลลิลิตร (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 17 ตุลาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ยาใส่แผล
ทิงเจอร์ไทเมอโรซอล
ชนิดน้ำ
[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาใส่แผลทิงเจอร์ไทเมอโรซอล ประกอบด้วย ไทเมอโรซอล (thimerosal)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาแผลสด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาบริเวณที่เป็นแผล

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปากหรือดวงตา เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายจากการใช้ยา
- หากใช้ยานี้แล้วแผลแห้งลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- ระคายเคืองที่ผิวหนังรุนแรง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: สารละลายใสสีเหลืองหรือน้ำตาล
- ตัวยาสาคัญ: ไทเมอโรซอล
- ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 30 มิลลิลิตร (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

**ยาใส่แผล
โพวิโดน-ไอโอดีน
ชนิดน้ำ
[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]**

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาใส่แผลโพวิโดน-ไอโอดีน ประกอบด้วย โพวิโดน-ไอโอดีน (povidone-iodine)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาแผลสด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- กำลังใช้ยา “ลิเทียม” ในการรักษาอาการคลุ้มคลั่ง
- ต่อมน้ำไทรอยด์ทำงานผิดปกติ
- เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

2.2 ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกร

หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- แผลเปิดขนาดใหญ่
- หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมลูก ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ตลอดช่วงการตั้งครรภ์ เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย

3. วิธีใช้ยา

3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาบริเวณที่เป็นแผล

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปากหรือดวงตา เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลาานาน เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายจากการใช้ยา
- หากใช้ยานี้แล้วแผลแห้งลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวน้ำหนักหลุดลอก หรือจ้ำตามผิวน้ำหนัก
- ระคายเคืองที่ผิวน้ำหนักรุนแรง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: สารละลายสีน้ำตาลเข้ม
- ตัวยาสำคัญ: โพวิโดน-ไอโอดีน
- ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 120 มิลลิลิตร (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 17 ตุลาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

**ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

ยาไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์

ชนิดน้ำ

[ข้อการค้า ปรับตามทะเบียน]

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ทำความสะอาดบาดแผล

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาทำความสะอาดบริเวณรอบบาดแผล

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปากหรือดวงตา เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- หากใช้ยานี้แล้วแผลแห้งหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียน] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: สารละลายใส สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน
- ตัวยาสาคัญ: ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์
- สารแต่งสี: สีน้ำเงิน No.42090 [ปรับตามทะเบียน]
- ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 450 มิลลิลิตร (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ยาเอทิลแอลกอฮอล์ ชนิดน้ำ

[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาเอทิลแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ทำความสะอาดบาดแผล

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาทำความสะอาดบริเวณรอบบาดแผล

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปากหรือดวงตา เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- หากใช้ยานี้แล้วแผลแห้งหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้าอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: สารละลายใส สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน
- ตัวยาสสำคัญ: เอทิลแอลกอฮอล์
- สารแต่งสี: สีน้ำเงิน No.42090
- ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 450 มิลลิลิตร (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

น้ำเกลือล้างแผล ชนิดน้ำ [ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า น้ำเกลือล้างแผล ประกอบด้วย โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ทำความสะอาดบาดแผล

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- ใช้ล้างทำความสะอาดบาดแผล

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปากหรือดวงตา เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- ห้ามนำน้ำยาที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำอีก เพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือปนเปื้อนจากน้ำยา
- หากใช้ยานี้แล้วแผลแฉะลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผื่น

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้มีอายุ 1 เดือนหลังจากเปิดใช้ครั้งแรก
- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: น้ำยาปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี
- ตัวยาสำคัญ: โซเดียมคลอไรด์
- ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 1 ลิตร (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

[ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.](#)

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
คลอโรไซลีนอล
ชนิดน้ำ
[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า น้ำยาฆ่าเชื้อโรคคลอโรไซลีนอล ประกอบด้วย คลอโรไซลีนอล (chloroxyleneol) และ ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ทำความสะอาดแผล

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้บริเวณที่มีผิวหนังอักเสบ

3. วิธีใช้ยา

3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- เจือจางน้ำยา 1 ส่วนกับน้ำ 19 ส่วน ก่อนใช้
- ใช้น้ำยาเช็ดทำความสะอาดแผล
- ห้ามใช้ยานี้กับบาดแผลโดยตรง

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปากหรือดวงตา เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- หากใช้ยานี้แล้วแผลแห้งลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตาม ผิวหนัง
- ระคายเคืองที่ผิวหนังรุนแรง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา]ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: สารละลายใส สีน้ำตาล
- ตัวยาสสำคัญ:
 - คลอโรไซลีนอล
 - ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์
- ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 450 มิลลิลิตร (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

ยาหม่อง
ชนิดขี้ผึ้ง
[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาสูตรผสม ชื่อว่า ยาหม่อง ซึ่งมีตัวยาสำคัญและส่วนประกอบตามที่ระบุในข้อ 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวด บวม อักเสบ จากแมลงกัด ต่อย หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีประวัติแพ้ยาแอสไพริน
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ทายาบริเวณที่มีอาการ วันละ 2-3 ครั้ง
- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด
- หลีกเลี่ยงการทายาใกล้เคียงผิวหนังบริเวณที่บอบบาง เช่น ริมฝีปาก หรือดวงตา หรือผิวหนังบริเวณที่มีบาดแผล

3.2 ถ้าใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่ยาสัมผัสโดนผิวหนังบริเวณที่บอบบาง เช่น ริมฝีปาก หรือดวงตา ให้ล้างยาออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ห้ามนำบริเวณที่ทายาเข้าใกล้เปลวไฟ เนื่องจากยาอาจติดไฟได้

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจ้ำตามผิวหนัง

• อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้าอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ผื่น แดง คัน หรือแสบร้อน บริเวณที่ทายา

6. ควรเก็บยาได้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ยามีลักษณะ** เป็นขี้ผึ้ง
- **ตัวยาสำคัญ** คือ เมทิลซาลิไซเลต (methyl salicylate) การบูร (camphor) เมนทอล (menthol) น้ำมันอบเชย (cinnamon oil) น้ำมันกานพลู (clove oil) น้ำมันยูคาลิปตัส (eucalyptus oil) น้ำมันสะระแหน่ (peppermint oil) น้ำมันสน (turpentine oil) ทิงเจอร์พริก (capsicum tincture) โคลโลโฟน (colophony)
<ปรับปรุงข้อมูลตามทะเบียนยา>
- **ขนาดบรรจุ** ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 30 กรัม (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ **อย.**

ยารักษาหิดเหา
เบนซิลเบนโซเอต
ความแรง 25%
ชนิดโลชั่น
[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียน]

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เบนซิลเบนโซเอต (benzyl benzoate) ความแรง 25% โดยน้ำหนักต่อปริมาตร (w/v)

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษา หิด เหา และโลน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
หากท่านมีอาการต่อไปนี้

- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- เชย่่าขวดก่อนใช้ยา
- สำหรับรักษาหิด
 - อาบน้ำให้สะอาด ใช้ผ้าหรือแปรงอ่อนๆ ถูตรงบริเวณที่มีผื่นคัน
 - ทายานี้ให้ทั่ว ทั้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วล้างออก
 - ทาซ้ำใหม่อีกครั้ง อีก 1 วัน

• สำหรับรักษาเหาและโลน

- ใส่ยานี้ให้ทั่วศีรษะหรือบริเวณที่มีเหาหรือโลน
- ในกรณีที่มีเหาหรือโลนจำนวนมาก ให้ใส่ยา 2 ครั้ง เช้า-เย็น
- ทั้งไว้จนครบไว้ 24 ชั่วโมง
- ล้างให้สะอาด
- เมื่อครบ 7 วัน ให้ทายาซ้ำอีกครั้ง

- สำหรับเด็กเล็ก ให้แบ่งยามาเติมน้ำเท่าปริมาณยาที่จะใช้ แล้วผสมให้เข้ากัน

• ห้ามกินยานี้เด็ดขาด

- ระมัดระวังอย่าให้ยาโดนผิวหนังบริเวณที่บอบบาง เช่น ริมฝีปาก หรือดวงตา

3.2 ถ้าลืมทายานี้ควรทำอย่างไร

- ให้ทายานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้
- ห้ามเพิ่มขนาดเพื่อชดเชยยาที่ลืม

3.3 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ซักล้างเสื้อผ้าและชุดเครื่องนอน เพื่อกำจัด หิด เหาและโลนที่อาจจะทำให้กลับมาเป็นซ้ำได้อีก

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังลอก มีจำตามผิวหนัง
“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ระคายเคือง แดง บริเวณที่ทายา

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นยาน้ำ
- **ตัวยาสำคัญ** คือ เบนซิลเบนโซเอต (benzyl benzoate)
- **ขนาดบรรจุ** ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 60 มิลลิลิตร (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

รหัส QR code นี้คือข้อมูลอ้างอิงผลิตภัณฑ์ของ **อย.**

ยารักษาหิด ชีฟิ่งกำมะถัน
ความแรง 10%
ชนิดชีฟิ่ง
[ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ชีฟิ่งกำมะถัน มีตัวยาคือ กำมะถัน (sublimed sulphur) ความแรง 10% โดยน้ำหนัก (w/w)

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคหิด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- อายุต่ำกว่า 12 ปี
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ทาบนผิวหนังบริเวณที่มีอาการ วันละ 2-3 ครั้ง
- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด
- หลีกเลี่ยงการทายาใกล้เคียงผิวหนังบริเวณที่บอบบาง เช่น ริมฝีปาก หรือดวงตา หรือผิวหนังบริเวณที่มีบาดแผล

3.2 ถ้าลืมทายานี้ควรทำอย่างไร

- ทายานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปทายาในครั้งถัดไป
- ห้ามเพิ่มขนาดยาเพื่อชดเชยยาที่ลืม

3.3 ถ้าทายาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ซักล้างเสื้อผ้าและชุดเครื่องนอน เพื่อกำจัดหิดที่อาจจะทำให้กลับมาเป็นซ้ำได้อีก

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีน้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ระคายเคืองบริเวณที่ทายา
- ผิวแห้ง

6. ควรเก็บยาได้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นยาชีฟิ่ง
- **ตัวยาคำคัญ** คือ กำมะถัน (sublimed sulphur)
- **ขนาดบรรจุ** ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 15 กรัม (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ **อย.**

ยารักษากลากเกลื้อน น้ำกัดเท้า ชนิดขี้ผึ้ง [ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยาเป็นยาสูตรผสม มีชื่อว่า ยารักษากลากเกลื้อน น้ำกัดเท้า มีตัวยาคือ กรดเบนโซอิก (benzoic acid) และกรดซาลิไซลิก (salicylic acid)

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษา กลากเกลื้อน และโรคน้ำกัดเท้า

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีโรคผิวหนังอักเสบ
- มีโรคสะเก็ดเงิน
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ทาบนผิวหนังบริเวณที่มีอาการ วันละ 2-3 ครั้ง
- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด

3.2 ถ้าลืมทายานี้ควรทำอย่างไร

- ทายานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปทายาในครั้งถัดไป
- ห้ามเพิ่มขนาดยาเพื่อชดเชยยาที่ลืม

3.3 ถ้าทายาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ อาจทำให้มีอาการอาเจียน ท้องเสีย หรือส่งผลต่อระบบประสาทได้ ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากให้ยานี้แล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ห้ามนำบริเวณที่ทายาเข้าใกล้เปลวไฟ เนื่องจากยาอาจติดไฟได้

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจ้ำตามผิวหนัง

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- แสบ ร้อน บริเวณที่ทายา

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ยามีลักษณะ** เป็นยาขี้ผึ้ง
- **ตัวยาสาคัญ** คือ กรดเบนโซอิก (benzoic acid) และ กรดซาลิไซลิก (salicylic acid)
- **ขนาดบรรจุ** ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 15 กรัม (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

ยารักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง
โคลทาร์
ความแรง 1%
ชนิดโลชั่น
[ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โคลทาร์ (coal tar) ความแรง 1% โดยน้ำหนัก (w/w)

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง เช่น เรื้อน กลาก ผื่นคัน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะภูมิแพ้รุนแรง
- มีภาวะผิวหนังแพ้แสง
- มีโรคแพ้ภูมิตัวเอง

2.2. ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- เชย่่าขวดก่อนใช้ยา
- ทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะทายา ก่อนทายานี้
- ทาบนผิวหนังบริเวณที่มีอาการ วันละ 2-3 ครั้ง
- ในเด็กหรือผู้สูงอายุ ให้ผสมยานี้กับน้ำเล็กน้อย ก่อนทาบนผิวหนัง
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด
- หลีกเลี่ยงการทายาใกล้เคียงผิวหนังบริเวณที่บอบบาง เช่น ริมฝีปาก หรือดวงตา หรือผิวหนังบริเวณที่มีบาดแผล

3.2 ถ้าลืมทายานี้ควรทำอย่างไร

- ทายานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปทายาในครั้งถัดไป
- ห้ามเพิ่มขนาดยาเพื่อชดเชยยาที่ลืม

3.3 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการโดนแสงอาทิตย์หลังจากทายานี้ เนื่องจากยาอาจทำให้เกิดอาการผิวหนังแพ้แสงได้
- ห้ามนำบริเวณที่ทายาเข้าไปใกล้เปลวไฟ เนื่องจากยาอาจติดไฟได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดงลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจ้ำตามผิวหนัง

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ระคายเคือง บริเวณที่ทายา
- ผื่นแดงแพ้แสง
- มีตุ่มคล้ายสิ่วขึ้นบริเวณที่ทายา

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นยาน้ำ
- **ตัวยาสำคัญ** คือ โคลทาร์ (coal tar)
- **ขนาดบรรจุ** ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 15 กรัม (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ยาทาแก้ผดผื่นคัน
คาลาไมน์
ชนิดโลชั่น
[ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาสูตรผสม มีตัวยาคือ คาลาไมน์ (calamine) และ ซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide)

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการผดผื่นคัน ระคายเคืองผิวหนังที่อาการไม่รุนแรง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่
- มีผิวหนังแห้ง

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ทายาบริเวณที่มีอาการ วันละ 3-4 ครั้ง
- เชย่ำขูดก่อนใช้ยา
- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด

3.2 ถ้าใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวน้ำลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

“ให้รีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้าอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์ทันที

- ผื่น แดง คัน บริเวณที่ทายา

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นยาน้ำ
- **ตัวยาคสำคัญ** คือ คาลาไมน์ (calamine) และ ซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide)
- **ขนาดบรรจุ** ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 180 มิลลิลิตร (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ยารักษาเกลื้อน
โซเดียมไทโอซัลเฟต
ชนิดผงสำหรับละลายน้ำ
สำหรับทา
[ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โซเดียมไทโอซัลเฟต (sodium thiosulfate)

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาเกลื้อน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีอาการต่อไปนี้

- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- เติมน้ำสะอาดจนถึงคอขวด เขย่าผสมกันจนตัวยาละลายหมด
- ทายาบนผิวหนังบริเวณที่มีอาการ ทุกครั้งหลังอาบน้ำเสร็จ
- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด

3.2 ถ้าลืมทายานี้ควรทำอย่างไร

- ทายานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปทายาในครั้งถัดไป
- ห้ามเพิ่มขนาดยาเพื่อชดเชยยาที่ลืม

3.3 ถ้าทายาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- แสบ ร้อน บริเวณที่ทายา

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- ยาที่ผสมน้ำแล้วจะมีอายุ 15 วัน
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ยามีลักษณะ** เป็นผงยา สำหรับผสมกับน้ำ
- **ตัวยาสำคัญ** คือ โซเดียมไทโอซัลเฟต (sodium thiosulfate)
- **ขนาดบรรจุ** ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 15 กรัม (ตามที่ขึ้นทะเบียน)

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

วิตามินบีรวม
ชนิดเม็ด หรือ ชนิดแคปซูล
[ข้อควรค่า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า วิตามินบีรวม
- เป็นยาในกลุ่ม วิตามิน

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาผู้ที่มีภาวะขาดวิตามินบี
- รักษาผู้ที่ขาดสารอาหารหรือรับประทานอาหารไม่เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงการขาดวิตามินบี
- ใช้บำรุงร่างกาย
- เสริมสร้างสุขภาพหรือการเจริญเติบโตของร่างกาย

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย

ให้บอกแพทย์หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ <ปรับตามทะเบียนยา>

- เด็ก 9-18 ปี กินยานี้ครั้งละ <...> เม็ด<แคปซูล> วันละ <...> ครั้ง หลังอาหาร
- ผู้ใหญ่ กินยานี้ครั้งละ <...> เม็ด <แคปซูล> วันละ <...> ครั้ง หลังอาหาร

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้
- ไม่แนะนำ ให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ยานี้อาจทำให้บัสสาวะมีสีเหลืองเข้มกว่าปกติ ซึ่งเป็นสีของวิตามินบีสอง และไม่เป็นอันตราย สามารถกินยาต่อได้ตามปกติ

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 10 เมษายน 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง หรือมีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้าอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดหัว
- คลื่นไส้

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง หรือในที่ชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ หรือห้องครัว
- ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา]
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ยามีลักษณะ** <ปรับตามทะเบียนยา>
- **ตัวยาสําคัญ** <ปรับตามทะเบียนยา>
 - วิตามินบีหนึ่ง (vitamin B1)
 - วิตามินบีสอง (vitamin B2)
 - วิตามินบีสาม (nicotinamide)
 - วิตามินบีห้า (pantothenic acid)
 - วิตามินบีหก (vitamin B6)
 - วิตามินบีสิบสอง (vitamin B12)
 - ไบโอดีน (biotin)
 - กรดโฟลิก (folic acid)

วิตามินซี
ชนิดเม็ด
ความแรง 100 มิลลิกรัม
[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า วิตามินซี
- เป็นยาในกลุ่ม วิตามิน

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ป้องกันการขาดวิตามินซี

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- มีแคลเซียมออกซาเลตปนออกมากับปัสสาวะ

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีการทำงานของไตบกพร่อง
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- เด็ก 6-12 ปี กินครั้งละ 1 เม็ด
- ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 2 เม็ด
- กินยานี้วันละ 1 ครั้ง

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้
- ไม่แนะนำให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล
พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม
ผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามใช้ยานี้ เมื่อเม็ดยาเปลี่ยนสี

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว
- ปวดท้อง ท้องเสีย
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ปัสสาวะออกมาก

“ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง หรือในที่ชื้น
เช่น ในรถ ห้องน้ำ หรือห้องครัว
- ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตาม
ทะเบียนยา]
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ยามีลักษณะ** เป็นเม็ด ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 10 เม็ด
(ตามที่ขึ้นทะเบียน)
- **ตัวยาสำคัญ** คือ วิตามินซี (ascorbic acid) 100
มิลลิกรัม

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ยาบำรุงโลหิต เฟอร์รัสซัลเฟต ชนิดเม็ด [ข้อควรคำ ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า เฟอร์รัสซัลเฟต (ferrous sulfate)
- เป็นยาในกลุ่ม ยาบำรุงโลหิต

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กในผู้ใหญ่

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- อยู่ระหว่างได้รับการรักษาด้วยการให้เลือด
- อยู่ระหว่างได้รับการรักษาด้วยการให้ธาตุเหล็กแบบฉีด
- มีโรคเกี่ยวกับการดูดซึมและเก็บธาตุเหล็กไว้ในร่างกายมากเกินไป
- มีแผลในกระเพาะอาหาร หรือโรคลำไส้อักเสบ
- มีภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- เพิ่งได้รับการผ่าตัดลำไส้ มีประวัติเป็นแผลในกระเพาะอาหาร โรคลำไส้อักเสบ หรือความผิดปกติเกี่ยวกับลำไส้
- มีโรคเบาหวาน
- มีภาวะขาดวิตามินบี 12
- มีโรคเกี่ยวกับเลือด
- มีภาวะเหล็กเกิน
- มีปัญหาเกี่ยวกับการกลืน
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- กินยาครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร
- กินยานี้พร้อมกับน้ำ ห้ามหักแบ่งหรือเคี้ยวเม็ดยา เพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองทางเดินอาหาร

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้
- ไม่แนะนำให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ในช่วงที่รับประทานยานี้ อาจจะทำให้อุจจาระมีสีดำได้
- ในกรณีที่มีอาการไม่สบายท้อง คลื่นไส้หลังรับประทานยา ให้รับประทานยาพร้อมอาหาร หรือค่อย ๆ เพิ่มขนาดยาจนถึงขนาดที่แนะนำ เพื่อช่วยลดอาการคลื่นไส้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ท้องผูกหรือท้องเสีย
- ปวดท้อง
- อุจจาระเป็นสีดำ
- ความอยากอาหารลดลง
- มีแผลในปาก

“ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง หรือในที่ชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ หรือห้องครัว
- ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา]
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ยามีลักษณะ** เป็นเม็ด ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 10 เม็ด (ตามที่ขึ้นทะเบียน)
- **ตัวยาสําคัญ** คือ เฟอร์รัสซัลเฟต คิดเป็นปริมาณธาตุเหล็ก 60 มิลลิกรัม

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

วิตามินรวม
ชนิดเม็ด/ชนิดแคปซูล
[ข้อควรคำ ปรึบตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า วิตามินรวม
- เป็นยาในกลุ่ม วิตามิน

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาผู้ที่มีภาวะขาดวิตามิน
- รักษาผู้ที่ขาดสารอาหารหรือรับประทานอาหารไม่เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงการขาดวิตามิน
- ใช้บำรุงร่างกาย
- เสริมสร้างสุขภาพหรือการเจริญเติบโตของร่างกาย

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ใ้บอกแพทย์หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ <ปรับตามทะเบียนยา>

- เด็ก 9-18 ปี กินยานี้ครั้งละ <...> เม็ด <แคปซูล> วันละ <...> ครั้ง หลังอาหาร
- ผู้ใหญ่ กินยานี้ครั้งละ <...> เม็ด <แคปซูล> วันละ <...> ครั้ง หลังอาหาร

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้
- ไม่แนะนำให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ใช้ยาในขนาดที่แนะนำ หรือตามขนาดที่แพทย์สั่ง เพื่อป้องกันไม่ให้อาสาะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอาการอันตราย
- ยานี้อาจทำให้ปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มกว่าปกติ ซึ่งเป็นสีของวิตามินบีสอง และไม่เป็นอันตราย สามารถกินยาต่อได้ตามปกติ

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง หรือมีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดท้อง
- คลื่นไส้

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง หรือในที่ชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ หรือห้องครัว
- ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส <ปรับตามทะเบียนยา>
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ยามีลักษณะ** <ปรับตามทะเบียนยา>
- **ตัวยาสําคัญ** <ปรับตามทะเบียนยา>
 - วิตามินเอ (vitamin A)
 - วิตามินดี (vitamin D)
 - วิตามินซี (vitamin C)
 - วิตามินบีหนึ่ง (vitamin B1)
 - วิตามินบีสอง (vitamin B2)
 - วิตามินบีสาม (nicotinamide)
 - วิตามินบีหก (vitamin B6)
 - วิตามินบีสิบสอง (vitamin B12)
 - กรดโฟลิก (folic acid)

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 10 เมษายน 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

น้ำมันตับปลา ชนิดแคปซูล [ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า น้ำมันตับปลา
- เป็นยาในกลุ่ม วิตามิน

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ป้องกันการขาดวิตามินเอ และ วิตามินดี ในผู้ใหญ่

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- มีระดับแคลเซียมในเลือดสูง
- มีนิ่วในไต หรือไตทำงานผิดปกติอย่างรุนแรง

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีการทำงานของตับหรือไตผิดปกติ
- เป็นโรคหัวใจ
- มีภาวะร่างกายอักเสบจากภูมิคุ้มกัน (sarcoidosis)
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- กินยานี้ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้
- ไม่แนะนำให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล
พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม
ผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ใช้ยาในขนาดที่แนะนำ หรือตามขนาดที่แพทย์สั่ง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้อาสาสมัครในร่างกายนทำให้เกิดอาการ
อันตราย

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจ้ำตามผิวหนัง
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ความอยากอาหารลดลง
- กระหายน้ำ
- ปวดท้อง ท้องผูก
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- ง่วงซึม

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นเม็ด ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 10 เม็ด (ตามที่ขึ้นทะเบียน)
- **ตัวยาสำคัญ** คือ วิตามินเอ (retinol) ไม่เกิน 4,000 IU และ วิตามินดี (cholecalciferol) ไม่เกิน 300 IU

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

น้ำมันตับปลา ชนิดน้ำ [ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า น้ำมันตับปลา
- เป็นยาในกลุ่ม วิตามิน

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ป้องกันการขาดวิตามินเอ และ วิตามินดี ในเด็ก

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- มีระดับแคลเซียมในเลือดสูง
- มีนิ่วในไต หรือไตทำงานผิดปกติอย่างรุนแรง

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีการทำงานของตับหรือไตผิดปกติ
- เป็นโรคหัวใจ
- มีภาวะร่างกายอักเสบจากภูมิคุ้มกัน (sarcoidosis)
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- เด็กอายุ แรกเกิด ถึง 1 ปี กินครั้งละ ¼ ช้อนชา (1.25 มิลลิลิตร)
- เด็กอายุ 1-4 ปี กินครั้งละ ครึ่งช้อนชา (2.5 มิลลิลิตร)
- เด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป กินครั้งละ 1 ช้อนชา
- กินยานี้วันละ 1 ครั้ง

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้
- ไม่แนะนำให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล
พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม
ผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ใช้ยาในขนาดที่แนะนำ หรือตามขนาดที่แพทย์สั่ง
เพื่อป้องกันไม่ให้อาสาะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอาการ
อันตราย

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจ้ำตามผิวหนัง
ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ความอยากอาหารลดลง
- กระหายน้ำ
- ปวดท้อง ท้องผูก
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- ง่วงซึม

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่
อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียน
ยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ
ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นน้ำ ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 400
มิลลิลิตร (ตาที่ขึ้นทะเบียน)
- **ตัวยาสําคัญ** คือ วิตามินเอ (retinol) ไม่เกิน 4,000 IU
ต่อ 5 มิลลิลิตร และ วิตามินดี (cholecalciferol) ไม่เกิน
300 IU ต่อ 5 มิลลิลิตร